

UNE GÉNÉRALISATION DE L'ALGÈBRE DE HECKE GRADUÉE DE TYPE B

CHARLOTTE DEZÉLÉE

RÉSUMÉ. On étudie une algèbre “proche” d’une algèbre de Hecke graduée et réalisable dans l’algèbre de Cherednik rationnelle de type B . On introduit pour cette algèbre des modules de la série principale et l’on démontre un critère d’irréductibilité de ces modules. On en déduit des résultats similaires pour une algèbre associée à un système de racines de type D .

For a root system of type B we study an algebra similar to a graded Hecke algebra, isomorphic to a subalgebra of the rational Cherednik algebra. We introduce principal series modules over it and prove an irreducibility criterion for these modules. We deduce similar results for an algebra associated to a root system of type D .

0. INTRODUCTION

Soit $W \rightarrow \mathrm{GL}(\mathfrak{a}_{\mathbb{R}}^*)$ la représentation « naturelle » d’un groupe de Weyl W et $R \subset \mathfrak{a}_{\mathbb{R}}^*$ le système de racines associé. On peut attacher à cette donnée plusieurs familles de $\mathbb{C}$ -algèbres. Nous nous intéressons ici à deux d’entre elles :

- L’algèbre de Cherednik rationnelle $\mathcal{H}(k)$, (cf. [2, 3] pour une définition précise). Elle dépend d’une fonction de multiplicités W -invariante $k : R \rightarrow \mathbb{C}$ et elle est engendrée par $\mathfrak{a}^* = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{a}_{\mathbb{R}}^*$, W et des opérateurs de Dunkl $T_y(k)$ pour $y \in \mathfrak{a}$ (le dual de $\mathfrak{a}^*$).
- L’algèbre de Hecke graduée $\mathbb{H}(k)$; cette algèbre dépend elle aussi d’une multiplicité k et est engendrée par les éléments de $\mathfrak{a}$ et W , soumis à certaines relations de commutation, voir [5, 6, 7].

Les représentations de dimension finie de $\mathbb{H}(k)$ ont été étudiées dans, par exemple, [5, 7] et celles de $\mathcal{H}(k)$ dans [1, 2].

Il a été remarqué par plusieurs auteurs, e.g. [3, 4], que lorsque R est de type A_{n-1} on peut réaliser $\mathbb{H}(k)$ dans $\mathcal{H}(k)$ de la façon suivante. On fixe une base (orthonormée) $\{e_1, \dots, e_n\}$ de $\mathfrak{a}_{\mathbb{R}}$, de base duale $\{z_1, \dots, z_n\}$; alors la sous-algèbre de $\mathcal{H}(k)$ engendrée par W et les $z_i T_{e_i}(k)$, $1 \leq i \leq n$, est isomorphe à $\mathbb{H}(k)$. Cette algèbre, que nous noterons $\mathbb{D}$, existant pour tous les types de systèmes de racines il est naturel de l’étudier et d’examiner les liens qui peuvent exister avec les algèbres de Hecke graduées (ou leurs généralisations).

On se propose ici d’étudier les représentations de l’algèbre $\mathbb{D}$ pour un système de racines de type B_n , dont les occurrences sont déjà nombreuses. S. Kakei a par exemple introduit une famille commutative $D_1, \dots, D_n$ d’éléments de $\mathcal{H}(k)$ qui avec W engendrent $\mathbb{D}$. Dans la première partie nous introduisons (par générateurs et relations) une algèbre $\mathbb{H}_B(\tilde{k})$ dont nous calculons le centre et montrons qu’elle est isomorphe à $\mathbb{D}$. Il faut noter qu’ici la fonction $\tilde{k}$ définie sur R est à valeurs dans l’algèbre du sous-groupe T de W engendré par les réflexions associées aux racines courtes.

Date: 11 juin 2003.

2000 Mathematics Subject Classification. 16Sxx, 20Cxx, 17Bxx.

Key words and phrases. groupe de Weyl, algèbre de Hecke, opérateur de Dunkl, série principale.

L'étude des représentations de dimension finie des algèbres de Hecke graduées repose en grande partie sur celle des modules de la série principale, notés $M(\lambda)$. Ils jouent le rôle des modules de Verma pour une algèbre de Lie semi-simple et ils sont paramétrés par les formes linéaires $\lambda \in \mathfrak{a}^*$. Ainsi, tout $\mathbb{H}(k)$ -module irréductible est quotient d'un $M(\lambda)$. Nous montrons que pour $\mathbb{H}_B(\tilde{k})$ une étude similaire est possible : on définit au § 2 des modules $M(\gamma \otimes \mu)$ indexés par les caractères $\gamma \otimes \mu$ de $S(\mathfrak{a}) \otimes \mathbb{C}T$, c'est à dire par $\gamma \in \mathfrak{a}^*$ et un caractère μ de T . Après avoir détaillé différentes propriétés de ces modules (poids, dual, etc.) nous montrons au § 3 comment leur structure peut se ramener à celle des modules de la série principale sur une algèbre de Hecke graduée associée à un système de racines de type $A_{i-1} \times A_{n-i-1}$ défini par μ (cf. Propositions 3.8 et 3.10) et nous en déduisons un critère d'irréductibilité pour $M(\gamma \otimes \mu)$ (cf. Théorème 3.11). L'étude de $\mathbb{H}_B(\tilde{k})$ utilise fortement l'existence d'un théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt (PBW) pour cette algèbre ; nous obtenons ce résultat grâce au théorème de PBW qui existe dans $\mathcal{H}(k)$, cf. [3].

Pour un système de racines de type D_n une étude de l'algèbre $\mathbb{D}$ montre qu'elle possède des propriétés (presque) analogues à celles de $\mathbb{H}_B(\tilde{k})$. Cette étude repose sur l'inclusion d'un système de racines de type D_n dans un système de type B_n et des résultats obtenus précédemment pour ce cas. C'est l'objet de la dernière section (cf., en particulier, le Théorème 4.9).

1. NOTATIONS ET PRÉLIMINAIRES

Soit W_B un groupe de Weyl de type B_n réalisé comme groupe de réflexions dans un espace vectoriel réel V de dimension n et R_B le système de racines correspondant à cette donnée. On note V^* le dual de V , $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le crochet de dualité, et $V_{\mathbb{C}}^*$, $V_{\mathbb{C}}$ les complexifiés respectifs. L'action de W_B s'étend naturellement en une action par automorphismes sur les algèbres symétriques $S(V_{\mathbb{C}})$ et $S(V_{\mathbb{C}}^*)$. Si $\alpha \in R_B$, on désigne par s_{α} la réflexion associée et $\alpha^{\vee} \in V^*$ la coracine.

On fixe une base orthonormée $\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n\}$ de V formée de racines courtes. On choisit $S_B = \{\epsilon_i - \epsilon_{i+1}, 1 \leq i \leq n-1; \epsilon_n\}$ comme ensemble de racines simples de sorte que $R_B^+ = \{\epsilon_i \pm \epsilon_j, 1 \leq i < j \leq n; \epsilon_k, 1 \leq k \leq n\}$ est l'ensemble des racines positives déterminé par ce choix.

Pour tous $1 \leq i, j \leq n$ on pose $\alpha_{i,j} = \epsilon_i - \epsilon_j$. Soit R_A le sous-ensemble de R_B constitué des $\pm \alpha_{i,j}$, $1 \leq i < j \leq n$; c'est un système de racines de type A_{n-1} . On note W_A le sous-groupe de W_B associé, $S_A = R_A \cap S_B = \{\alpha_i = \epsilon_i - \epsilon_{i+1}, 1 \leq i \leq n-1\}$ l'ensemble des racines simples et ℓ la longueur sur W_A définie par S_A . L'action par permutation de W_A sur la base $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ définit une action sur $\{1, \dots, n\}$ en posant $w * i = j$ si $w(\epsilon_i) = \epsilon_j$, ce qui permet d'identifier W_A avec le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$.

L'algèbre du groupe W_B est désignée par $\mathbb{C}W_B = \mathbb{C}\langle t_w, w \in W_B \rangle$. On écrira $t_i = t_{s_{\epsilon_i}}$, $1 \leq i \leq n$, $s_{p,q} = s_{\alpha_{p,q}}$, $1 \leq p < q \leq n$.

Soit T le sous-groupe (normal abélien) de W_B engendré par les s_{ϵ_i} , $1 \leq i \leq n$. On a donc $T \simeq \{\pm 1\}^n$ et $W_B = T \rtimes W_A$. Si $T^{\vee}$ désigne le groupe des caractères de T on identifie $\mathbb{C}T^{\vee}$ au dual $(\mathbb{C}T)^*$, en étendant un élément de $T^{\vee}$ en une forme linéaire sur $\mathbb{C}T$. Le groupe W_A opère sur $T^{\vee}$ par la formule ${}^w\mu(x) = \mu(w^{-1}xw)$ pour tous $w \in W_A, \mu \in T^{\vee}, x \in T$. On notera $W_A(\mu)$ le stabilisateur de $\mu \in T^{\vee}$ pour cette action.

On rappelle que tout caractère de l'algèbre $S(V_{\mathbb{C}})$ est déterminé par un élément de $V_{\mathbb{C}}^*$ et que l'action de $w \in W_A$ sur $\gamma \in V_{\mathbb{C}}^*$ est définie par ${}^w\gamma(\zeta) = \gamma(w^{-1}(\zeta))$ pour tout $\zeta \in V_{\mathbb{C}}$.

1.1. Algèbre de Hecke graduée. Soit $R \subset V$ un système de racines de base S , de groupe de Weyl W . Une multiplicité sur R est une fonction W -invariante $c : R \rightarrow \mathbb{C}$. On peut lui associer une

algèbre de Hecke graduée $\mathbb{H}_{gr}(c, S)$ définie de la manière suivante. L'algèbre $\mathbb{H}_{gr}(c, S)$ est engendrée par les éléments $\zeta \in V$ et $t_w, w \in W$, soumis aux relations :

- $\mathbb{C}\langle \zeta \in V \rangle \simeq S(V_{\mathbb{C}})$, $\mathbb{C}\langle t_w, w \in W \rangle \simeq \mathbb{C}W$;
- $t_{s_\alpha} \zeta = s_\alpha(\zeta) t_{s_\alpha} + \langle \alpha^\vee, s_\alpha(\zeta) \rangle c_\alpha$ pour tout $\alpha \in S$.

Cette algèbre vérifie un théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt

$$(PBW0) \quad \mathbb{H}_{gr}(c, S) \simeq S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W$$

comme espace vectoriel, ou $S(V_{\mathbb{C}})$ -module (cf. [6]).

Pour tout caractère $\gamma : S(V_{\mathbb{C}}) \rightarrow \mathbb{C}$, défini par $\gamma \in V_{\mathbb{C}}^*$, on note $\mathbb{C}v_\gamma$ la représentation de dimension 1 correspondante et l'on construit un module induit, appelé module de la série principale,

$$M(\gamma) = \text{Ind}_{S(V_{\mathbb{C}})}^{\mathbb{H}_{gr}(c, S)}(\mathbb{C}v_\gamma).$$

On sait qu'alors $M(\gamma) = \bigoplus_{w \in W} \mathbb{C}t_w \otimes v_\gamma$ et l'on dispose d'un critère d'irréductibilité pour ce module (cf. [5]). On se propose de généraliser cette notion, et le critère d'irréductibilité, à une nouvelle algèbre associée à un système de racines de type B .

1.2. Une généralisation de l'algèbre de Hecke graduée. On reprend les notations précédentes relatives à un système de racines de type B_n . Soit $\bar{k} = (k, k_c) : R_B \rightarrow \mathbb{C}$ une multiplicité de valeur $k \neq 0$ sur les racines longues et k_c sur les racines courtes. Généralisons la notion de multiplicité en définissant dans ce cadre une fonction $\tilde{k} : R_A \rightarrow \mathbb{C}T$ en posant :

$$\tilde{k}_{\alpha_{i,j}} = k(1 + t_i t_j)$$

pour tous $1 \leq i \neq j \leq n$. Il résulte de $wt_i t_j w^{-1} = t_{w*i} t_{w*j}$, pour $w \in W_A$, que

$$\tilde{k}_{w(\alpha)} = w \tilde{k}_\alpha w^{-1} \text{ pour tous } w \in W_A, \alpha \in R_A.$$

Donc $\tilde{k}$ est W_A -équivariante. Soit alors $\mathbb{H}_B = \mathbb{H}_B(\tilde{k})$ l'algèbre engendrée par les éléments $\zeta \in V$, $t_w \in W_B$ soumis aux relations :

- (a) $\mathbb{C}\langle \zeta \in V \rangle \simeq S(V_{\mathbb{C}})$, $\mathbb{C}\langle t_w, w \in W_B \rangle \simeq \mathbb{C}W_B$;
- (b) $t_w \zeta = \zeta t_w$ pour tous $w \in T$, $\zeta \in V$;
- (c) $t_{s_\alpha} \zeta = s_\alpha(\zeta) t_{s_\alpha} + \langle \alpha^\vee, s_\alpha(\zeta) \rangle \tilde{k}_\alpha$ pour tout $\alpha \in S_A$.

Observons qu'en prenant $\zeta = \epsilon_j$ et $s_\alpha = s_{\alpha_i}$ dans (c) on obtient :

$$(1.1) \quad t_{s_{\alpha_i}} \epsilon_j = \epsilon_{s_{\alpha_i} * j} t_{s_{\alpha_i}} - \langle \alpha_i^\vee, \epsilon_j \rangle \tilde{k}_{\alpha_i}.$$

Remarquons également que $\mathbb{H}_B$ est engendrée par les t_w et les ϵ_j et que, grâce à (1.1), tout élément de $\mathbb{H}_B$ est combinaison linéaire de monômes de la forme $\epsilon_1^{j_1} \cdots \epsilon_n^{j_n} t_w$.

1.3. PBW. Soit $\mathfrak{a}_{\mathbb{R}}$ un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel euclidien de dimension n , $R_B \subset \mathfrak{a}_{\mathbb{R}}^*$ un système de racines de type B_n , $\mathfrak{a} = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{a}_{\mathbb{R}}$, $\mathcal{P} = S(\mathfrak{a}^*)$, $\mathcal{S} = S(\mathfrak{a})$. Rappelons qu'à la multiplicité $\bar{k} : R_B \rightarrow \mathbb{C}$ on peut associer une algèbre de Cherednik rationnelle notée $\mathcal{H}_B(\bar{k})$, $\mathcal{H}(\bar{k})$ ou $\mathcal{H}$, dont une réalisation dans $\text{End}_{\mathbb{C}} \mathcal{P}$ est fournie, via les opérateurs de Dunkl, de la façon suivante (cf. [2, 3]). Si $w \in W_B$ on note ici $t_w \in \text{Aut } \mathcal{P}$ l'automorphisme associé et pour tout $y \in \mathfrak{a}$ on pose

$$T_y = T_y(\bar{k}) = T_y^B(\bar{k}) = \partial_y + \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in R_B} \bar{k}_\alpha \frac{\langle \alpha, y \rangle}{\alpha} (1 - t_{s_\alpha}).$$

Alors, $\mathcal{H}$ est la sous-algèbre de $\text{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{P})$ engendrée par les $t_w, w \in W_B$, $x \in \mathfrak{a}^*$ et les $T_y, y \in \mathfrak{a}$. Ces générateurs vérifient les relations suivantes :

- (1) $[T_y, x] = \langle y, x \rangle + \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in R_B} \bar{k}_\alpha \langle y, \alpha \rangle \langle \alpha^\vee, x \rangle t_{s_\alpha}$;
- (2) $t_w x t_{w^{-1}} = w(x)$;
- (3) $t_w T_y t_{w^{-1}} = T_{w(y)}$.

Il résulte de [3, Theorem 1.3] que l'on a un théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt dans $\mathcal{H}$:

Théorème 1.1 (PBW1). *Le $\mathcal{P}$ -module $\mathcal{H}$ est isomorphe à $\mathcal{P} \otimes \mathcal{S} \otimes \mathbb{C}W_B$.*

Nous allons montrer que $\mathbb{H}_B$ se réalise comme une sous-algèbre de $\mathcal{H}$ à l'aide d'opérateurs introduits par S. Kakei dans [4]. On fixe une base orthonormée $\{e_1, \dots, e_n\}$ de $\mathfrak{a}_{\mathbb{R}}$, de base duale $\{z_1, \dots, z_n\}$. Soit $\mathbb{D}_B$ la sous-algèbre de $\mathcal{H}$ engendrée par les $z_j T_{e_j}$, $j = 1, \dots, n$, et les t_w , $w \in W_B$. On pose :

$$D_j = D_j^B = z_j T_{e_j} + \sum_{1 \leq i < j} \tilde{k}_{\alpha_{i,j}} t_{s_{\alpha_{i,j}}}.$$

(Les D_j sont les opérateurs $\hat{D}_j^B$ définis en [4, § 2.3].) Il est clair que

$$\mathbb{D}_B = \mathbb{C}\langle D_1, \dots, D_n; t_w, w \in W_B \rangle.$$

On vérifie facilement que les D_j sont linéairement indépendants et que l'on a les relations suivantes dans $\mathcal{H}$:

- (1) $D_i D_j = D_j D_i$;
- (2) $D_j t_i = t_i D_j$;
- (3) $t_{s_{\alpha_i}} D_j = D_{s_{\alpha_i} * j} t_{s_{\alpha_i}} - \langle \alpha_i^\vee, \epsilon_j \rangle \tilde{k}_{\alpha_i}$.

On pose $V' = \bigoplus_{j=1}^n \mathbb{R} D_j$; comme les D_j commutent, la $\mathbb{C}$ -algèbre qu'ils engendrent est un quotient de $S(V'_{\mathbb{C}})$. Elle est en fait égale à $S(V'_{\mathbb{C}})$, comme le montre le résultat suivant :

Lemme 1.2 (PBW2). *Le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{D}_B$ est isomorphe à $S(V'_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W_B$.*

Démonstration. Si $j = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{N}^n$ on posera $|j| = j_1 + \dots + j_n$, $z^j = z_1^{j_1} \dots z_n^{j_n}$, $T^j = T_{e_1}^{j_1} \dots T_{e_n}^{j_n}$ et $D_j = D_1^{j_1} \dots D_n^{j_n}$. Il résulte des relations ci-dessus que tout élément de $\mathbb{D}_B$ peut s'écrire

$$P = \sum_{d=0}^m \sum_{|j|=d, w \in W_B} \lambda_{j,w} D^j t_w$$

pour des $\lambda_{j,w} \in \mathbb{C}$; il s'agit de voir que cette écriture est unique. Supposons $P = 0$. Il existe alors un couple (j, w) tel que $\lambda_{j,w} \neq 0$ et $|j| = m$ maximal pour cette propriété. La définition des D_p et les relations de commutation dans $\mathcal{H}$ entraînent que si $|p| = d$, $D^p = z^p T^p + Q$ avec $Q \in \mathcal{PS}_{d-1} \mathbb{C}W_B$, où l'on a posé $\mathcal{S}_{d-1} = \bigoplus_{|i| \leq d-1} \mathbb{C} T^i$. On obtient ainsi $P = \sum_{|j|=m, w \in W_B} \lambda_{j,w} z^j T^j t_w + R$ avec $R \in \mathcal{PS}_{m-1} \mathbb{C}W_B$. Le Théorème 1.1 implique alors que $\lambda_{j,w} = 0$ pour tout $|j| = m$, ce qui contredit l'hypothèse. $\square$

Théorème 1.3 (PBW3). *L'application $\Phi : \mathbb{H}_B \rightarrow \mathbb{D}_B$ définie par*

$$\Phi(\epsilon_j) = D_j, \quad \Phi(t_w) = t_w, \quad \text{pour } j = 1, \dots, n \text{ et } w \in W_B,$$

est un isomorphisme d'algèbres. En particulier, $\mathbb{H}_B$ est isomorphe à $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W_B$ comme $S(V_{\mathbb{C}})$ -module.

Démonstration. La définition par générateurs et relations de $\mathbb{H}_B = \mathbb{C}\langle \epsilon_1, \dots, \epsilon_n; t_w, w \in W_B \rangle$ et les relations précédentes dans $\mathbb{D}_B$ montrent que Φ définit un morphisme surjectif d'algèbres. Le Lemme 1.2 assure que Φ est injectif. La deuxième assertion est alors évidente. $\square$

1.4. Relations de commutation dans $\mathbb{H}_B$. Précisons les relations de commutation dans $\mathbb{H}_B$. Rappelons que l'ensemble d'inversion de $w^{-1} \in W_A$ est $R(w^{-1}) = \{\alpha \in R_A^+ : w^{-1}(\alpha) \in R_A^-\}$ et que $\ell(s_\alpha w) < \ell(w)$ pour tout $\alpha \in R(w^{-1})$.

Lemme 1.4. *Pour tous $\zeta \in V$ et $w \in W_A$, on a :*

$$t_w \zeta = w(\zeta) t_w + \sum_{\alpha \in R(w^{-1})} \langle \alpha^\vee, w(\zeta) \rangle \tilde{k}_\alpha t_{s_\alpha w} = w(\zeta) t_w + \sum_{\alpha \in R(w^{-1})} \langle \alpha^\vee, w(\zeta) \rangle t_{s_\alpha w} \tilde{k}_{w^{-1}(\alpha)}.$$

En particulier, pour $1 \leq p < q \leq n$:

$$\begin{aligned} t_{s_{p,q}} \zeta &= s_{p,q}(\zeta) t_{s_{p,q}} + \sum_{p+1 \leq j < q} \langle \alpha_{j,q}^\vee, s_{p,q}(\zeta) \rangle t_{s_{j,q} s_{p,q}} \tilde{k}_{\alpha_{j,p}} + \sum_{p+1 \leq j < q} \langle \alpha_{p,j}^\vee, s_{p,q}(\zeta) \rangle t_{s_{p,j} s_{p,q}} \tilde{k}_{\alpha_{j,q}} \\ &\quad + \langle \alpha_{p,q}^\vee, s_{p,q}(\zeta) \rangle \tilde{k}_{\alpha_{p,q}}. \end{aligned}$$

Démonstration. La multiplicité $\tilde{k}$ étant W_A -équivariante et commutant aux éléments de V , la première formule se démontre comme celle de [7, Proposition 1.1(1)] dans une algèbre de Hecke graduée. La seconde résulte de $R(s_{p,q}^{-1}) = R(s_{p,q}) = \{\alpha_{j,q}, \alpha_{p,i} : p \leq j < q, p+1 \leq i < q\}$. $\square$

Définissons des « opérateurs de différences divisées » $\Delta_j \in \text{End } S(V_{\mathbb{C}})$ par

$$\Delta_j(p) = k(p - s_{\alpha_j}(p)) / \alpha_j$$

pour $p \in S(V_{\mathbb{C}})$ et $j \in \{1, \dots, n-1\}$. Rappelons que dans $\mathbb{H}_{gr}(k, S_A)$ on a $\Delta_j(p) = t_{s_{\alpha_j}} p - s_{\alpha_j}(p) t_{s_{\alpha_j}}$. On généralise donc ces opérateurs en définissant, pour tout $j \in \{1, \dots, n-1\}$, $\tilde{\Delta}_j : S(V_{\mathbb{C}}) \rightarrow \mathbb{H}_B$ par

$$\tilde{\Delta}_j(p) = t_{s_{\alpha_j}} p - s_{\alpha_j}(p) t_{s_{\alpha_j}},$$

où ici le calcul s'effectue dans $\mathbb{H}_B$.

Lemme 1.5. *Soit $p \in S(V_{\mathbb{C}})$, alors pour tout $j \in \{1, \dots, n-1\}$, on a :*

$$\tilde{\Delta}_j(p) = \Delta_j(p)(1 + t_j t_{j+1}) = \tilde{k}_{\alpha_j}(p - s_{\alpha_j}(p)) / \alpha_j.$$

Démonstration. Démontrons le résultat par récurrence sur le degré de p . Pour p de degré 1, il provient directement des relations (c), § 1.2, dans $\mathbb{H}_B$. Supposons qu'il soit vrai pour $p_1, p_2 \in S(V_{\mathbb{C}})$ et montrons le pour le produit $p_1 p_2$. On a :

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta}_j(p_1 p_2) &= t_{s_{\alpha_j}} p_1 p_2 - s_{\alpha_j}(p_1) s_{\alpha_j}(p_2) t_{s_{\alpha_j}} \\ &= (t_{s_{\alpha_j}} p_1 - s_{\alpha_j}(p_1) t_{s_{\alpha_j}}) p_2 + s_{\alpha_j}(p_1) \tilde{\Delta}_j(p_2) \\ &= \tilde{\Delta}_j(p_1) p_2 + s_{\alpha_j}(p_1) \tilde{\Delta}_j(p_2) \\ &= \Delta_j(p_1) p_2 (1 + t_j t_{j+1}) + s_{\alpha_j}(p_1) \Delta_j(p_2) (1 + t_j t_{j+1}), \end{aligned}$$

car les éléments de T et $S(V_{\mathbb{C}})$ commutent. Il suffit alors pour conclure de remarquer que $\Delta_j(p_1) p_2 + s_{\alpha_j}(p_1) \Delta_j(p_2) = \Delta_j(p_1 p_2)$. $\square$

Rappelons que $k \neq 0$. De (PBW3) il résulte donc que

$$\tilde{\Delta}_j(p) = 0 \iff \Delta_j(p) = 0 \iff s_{\alpha_j}(p) = p.$$

Ainsi l'intersection des noyaux (dans $S(V_{\mathbb{C}})$) des $\tilde{\Delta}_j, j = 1, \dots, n$, est l'algèbre $S(V_{\mathbb{C}})^{W_A}$ des éléments W_A -invariants de $S(V_{\mathbb{C}})$.

1.5. **Centre de $\mathbb{H}_B$.** Rappelons que tout élément t_x , $x \in T$, est de la forme $t_{\underline{i}} = t_{i_1} \cdots t_{i_j}$ pour un multi-indice $\underline{i} = \{1 \leq i_1 < \cdots < i_j \leq n\}$ de longueur $j \in \{0, \dots, n\}$. Remarquons que le groupe W_A opère dans $\mathbb{C}T$ par conjugaison et que $t_{\underline{i}}$ est conjugué (par cette action) à $t_{\underline{i}'}$ si et seulement si $|\underline{i}| = |\underline{i}'|$. Pour chaque $j \in \{1, \dots, n\}$, on pose :

$$\vartheta_j = \sum_{|\underline{i}|=j} t_{\underline{i}}.$$

Il est alors facile de voir que l'algèbre d'invariants $(\mathbb{C}T)^{W_A}$ est égale à $\mathbb{C}[\vartheta_1, \dots, \vartheta_n] = \bigoplus_{j=0}^n \mathbb{C}\vartheta_j$.

Lemme 1.6. *Le centralisateur $\{c \in \mathbb{H}_B : [c, V] = 0\}$ de V dans $\mathbb{H}_B$ est la sous-algèbre (commutative) $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T$.*

Démonstration. Soit $0 \neq c \in \mathbb{H}_B$; par (PBW3) on peut écrire de manière unique c sous la forme $\sum_{w \in W_A, x \in T} p_{w,x} t_w t_x$ pour des $p_{w,x} \in S(V_{\mathbb{C}})$ non tous nuls. Posons $\mathcal{C} = \{(w, x) \in W_A \times T : p_{w,x} \neq 0\}$ et notons $m = \max\{\ell(w) : \exists x \in T, (w, x) \in \mathcal{C}\}$. Si $\xi \in V$ il vient, en utilisant le Lemme 1.4,

$$\begin{aligned} [c, \xi] &= \sum_{(w,x) \in \mathcal{C}} p_{w,x} (t_w \xi - \xi t_w) t_x \\ &= \sum_{(w,x) \in \mathcal{C}, \ell(w)=m} p_{w,x} (w(\xi) - \xi) t_w t_x + \sum_{(w',x') \in W_A \times T, \ell(w') < m} q_{w',x'} t_{w'} t_{x'} \end{aligned}$$

avec $q_{w',x'} \in S(V_{\mathbb{C}})$. Par conséquent (PBW3) assure que si c est dans le centralisateur de V et $(w, x) \in \mathcal{C}$ vérifie $\ell(w) = m$, alors $w(\xi) = \xi$ pour tout ξ , i.e. $w = \text{id}$. Donc $m = 0$ et $c \in S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T$. $\square$

Rappelons que le centre d'une algèbre de Hecke graduée $\mathbb{H}_{gr}(c, S)$ comme en 1.1 est $S(V_{\mathbb{C}})^W$. Pour $\mathbb{H}_B$ le centre, $Z(\mathbb{H}_B)$, est donné par le théorème suivant.

Théorème 1.7. *On a $Z(\mathbb{H}_B) = S(V_{\mathbb{C}})^{W_A} \otimes (\mathbb{C}T)^{W_A} = \bigoplus_{j=0}^n S(V_{\mathbb{C}})^{W_A} \vartheta_j$.*

Démonstration. Observons que $c \in Z(\mathbb{H}_B)$ si et seulement si $[c, V] = [c, T] = [t_{s_{\alpha_j}}, c] = 0$ pour $j = 1, \dots, n-1$. Par le Lemme 1.6, ceci équivaut à $c \in S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T$ et $[t_{s_{\alpha_j}}, c] = 0$ pour $j = 1, \dots, n-1$. Écrivons $c = \sum_{x \in T} p_x t_x$ avec $p_x \in S(V_{\mathbb{C}})$. Avec les notations de 1.4 on trouve que

$$\begin{aligned} [t_{s_{\alpha_j}}, c] &= \sum_x t_{s_{\alpha_j}} p_x t_x - \sum_x p_x t_{s_{\alpha_j}} t_{s_{\alpha_j} x s_{\alpha_j}} \\ &= \sum_x (s_{\alpha_j}(p_x) - p_{s_{\alpha_j} x s_{\alpha_j}}) t_{s_{\alpha_j}} t_x + \sum_x \tilde{\Delta}_j(p_x) t_x. \end{aligned}$$

On déduit donc de (PBW3) que $[t_{s_{\alpha_j}}, c] = 0$ si, et seulement si, $\tilde{\Delta}_j(p_x) = 0$ et $s_{\alpha_j}(p_x) = p_{s_{\alpha_j} x s_{\alpha_j}}$ pour tous $x \in T$, $1 \leq j \leq n-1$. Par la remarque suivant le Lemme 1.5 ces conditions équivalent à $p_x \in S(V_{\mathbb{C}})^{W_A}$ et $p_x = p_{w x w^{-1}}$ pour tout $x \in T$, ce qui compte tenu de la définition des ϑ_j s'écrit aussi $c = \sum_{j=0}^n p_j \vartheta_j$ avec $p_j \in S(V_{\mathbb{C}})^{W_A}$. $\square$

1.6. **Automorphismes et anti-automorphismes de $\mathbb{H}_B$.** Soit R une $\mathbb{C}$ -algèbre. On note $R\text{-Mod}$, resp. $\text{Mod-}R$, la catégorie des R -modules à gauche, resp. droite. La sous-catégorie de $R\text{-Mod}$ formée des modules de dimension finie est désignée par $R\text{-mod}$. Le treillis, ordonné par inclusion, des sous-modules de $M \in R\text{-Mod}$ sera noté $\mathcal{L}_R(M)$ et la longueur de M par $\text{lg}_R(M)$. Soit S une autre $\mathbb{C}$ -algèbre et $N \in S\text{-Mod}$; on écrira $\mathcal{L}_R(M) \cong \mathcal{L}_S(N)$ pour signifier qu'il existe un isomorphisme de $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels $f : M \rightarrow N$ tel que $X \mapsto f(X)$ induise un isomorphisme entre les treillis ordonnés $\mathcal{L}_R(M)$ et $\mathcal{L}_S(N)$. Tout $M \in R\text{-mod}$ est de longueur finie et on peut lui associer la suite $\mathcal{S}_R(M) = \{[S_i(M)]\}_{1 \leq i \leq t}$ des classes d'isomorphisme des sous-quotients simples de M , comptés sans multiplicité. Il est clair que si $\mathcal{L}_R(M) \cong \mathcal{L}_S(N)$, une suite de composition de M est transformée par f en une suite de composition de N et les $[f(S_i(M))]$ sont donc les éléments de la suite $\mathcal{S}_S(N)$.

Rappelons que si $M \in R\text{-Mod}$ et $\varkappa \in \text{Aut}_{\mathbb{C}}(R)$, on peut définir un module ${}^{\varkappa}M \in R\text{-Mod}$ de la façon suivante : ${}^{\varkappa}M = M$ comme $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, muni de l'action $a \cdot u = \varkappa(a).u$ pour $a \in R, u \in M$. Notons que cette torsion par $\varkappa$ laisse stable $R\text{-mod}$ et conserve la longueur. Rappelons aussi qu'un anti-automorphisme $\mathbb{C}$ -linéaire ι de R fournit un isomorphisme entre $R\text{-Mod}$ et $\text{Mod-}R$: on fait de $M \in R\text{-Mod}$ un R -module à droite en posant $M^{\iota} = M$ comme $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, muni de la structure de R -module à droite définie par $u.a = \iota(a).u$. L'existence de ι permet de munir le dual $M^* = \text{Hom}_{\mathbb{C}}(M, \mathbb{C})$ d'une structure de R -module à gauche par la formule

$$\langle a.f, u \rangle = \langle f, \iota(a).u \rangle,$$

pour tous $a \in R, f \in M^*, u \in M$. Si de plus ι est involutif et $M \in R\text{-mod}$ l'application bijective canonique $c_M : M \rightarrow M^{**}$ est alors un isomorphisme de R -modules et l'on a $\text{lg}_R(M) = \text{lg}_R(M^*)$.

Donnons des exemples dans l'algèbre $\mathbb{H}_B$ pour lesquels on peut effectuer les constructions précédentes. Observons qu'un élément de $\text{GL}(\mathbb{H}_B)$ définit un (anti)-automorphisme si, et seulement si, il préserve les relations (a), (b) et (c) introduites en 1.2.

(1) Chaque $w \in W_B$ définit un automorphisme intérieur de $\mathbb{H}_B$ donné par $\text{Int}(w) : a \mapsto t_w a t_w^{-1}$; le module tordu par l'action de $\text{Int}(w)$ sera noté wM .

(2) Le déterminant dans $\text{GL}(V)$ définit le caractère $\text{sgn} : W_B \rightarrow \{\pm 1\}$ par $\text{sgn}(w) = \det(w)$. En particulier, sgn fournit un élément de $T^{\vee}$ et pour $\mu \in T^{\vee}$ on pose $-\mu = \text{sgn} \otimes \mu \in T^{\vee}$; ce caractère est déterminé par $(-\mu)(t_j) = -\mu(t_j)$ pour tout $j = 1, \dots, n$. L'application $\delta : x \mapsto \text{sgn}(x)t_x, x \in T$, induit un automorphisme de $\mathbb{C}T$ tel que $\delta(t_i t_j) = t_i t_j$ pour tous i, j . On obtient un automorphisme de $\mathbb{H}_B$ en étendant δ comme suit :

$$\delta(\xi) = \xi, \quad \delta(t_x) = \text{sgn}(x)t_x, \quad \delta(t_w) = t_w,$$

pour tous $\xi \in V, x \in T, w \in W_A$.

(3) On vérifie facilement que les formules ci-dessous donnent un anti-automorphisme involutif ι de $\mathbb{H}_B$:

$$\iota(\xi) = -\xi, \quad \iota(t_w) = \text{sgn}(w)t_{w^{-1}},$$

pour tous $\xi \in V, w \in W_B$.

Il résulte en particulier de (3) que $\mathbb{H}_B\text{-Mod} \simeq \text{Mod-}\mathbb{H}_B$ et $\mathbb{H}_B\text{-mod} \simeq \text{mod-}\mathbb{H}_B$.

2. MODULES DE LA SÉRIE PRINCIPALE

On va définir pour $\mathbb{H}_B$, de même que pour une algèbre de Hecke graduée, les modules de la série principale pour lesquels on démontrera dans la section suivante un critère d'irréductibilité.

2.1. Poids des $\mathbb{H}_B$ -modules de dimension finie. Un morphisme d'algèbres $\tilde{\gamma} : S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T \rightarrow \mathbb{C}$ est uniquement déterminé par une forme linéaire $\gamma \in V_{\mathbb{C}}^*$ et un caractère $\mu \in T^{\vee}$; nous le noterons $\gamma \otimes \mu$. On a donc $(\gamma \otimes \mu)(v \oplus t) = \gamma(v)\mu(t)$, pour $v \in V_{\mathbb{C}}, t \in \mathbb{C}T$. On désigne par $\mathcal{A} = \{\gamma \otimes \mu : \gamma \in V_{\mathbb{C}}^*, \mu \in T^{\vee}\}$ l'ensemble des caractères de $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T$.

Soient M un $\mathbb{H}_B$ -module de dimension finie et $\tilde{\nu} \in \mathcal{A}$. Les sous-espaces poids et sous-espaces poids généralisés de M associés à $\tilde{\nu}$ sont respectivement :

$$M_{\tilde{\nu}} = \{m \in M : \forall a \in V_{\mathbb{C}} \oplus \mathbb{C}T, a.m = \tilde{\nu}(a)m\}$$

et

$$M_{\tilde{\nu}}^{\text{gen}} = \{m \in M : \forall a \in V_{\mathbb{C}} \oplus \mathbb{C}T, \exists k \in \mathbb{N}, (a - \tilde{\nu}(a))^k.m = 0\}.$$

On dira que $\tilde{\nu}$ est un poids de M si $M_{\tilde{\nu}}^{gen} \neq 0$ (ce qui équivaut à $M_{\tilde{\nu}} \neq 0$). Comme $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T$ est une sous-algèbre commutative de $\mathbb{H}_B$, on a :

$$M = \bigoplus_{\tilde{\nu} \in \mathcal{A}} M_{\tilde{\nu}}^{gen}.$$

2.2. Modules de la série principale. Pour tout $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \mu \in \mathcal{A}$ on notera ${}^w\tilde{\gamma} = {}^w\gamma \otimes {}^w\mu$ l'action diagonale de $w \in W_A$ et on désigne par $\mathbb{C}v_{\tilde{\gamma}}$ le $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T$ -module de dimension 1 défini par : $a.v_{\tilde{\gamma}} = \tilde{\gamma}(a)v_{\tilde{\gamma}}$ pour tout $a \in S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T$. Le $\mathbb{H}_B$ -module de la série principale $M(\tilde{\gamma})$ associé à $\tilde{\gamma}$ est le module induit de $\mathbb{C}v_{\tilde{\gamma}}$ à $\mathbb{H}_B$:

$$M(\tilde{\gamma}) = \mathbb{H}_B \otimes_{S(V_{\mathbb{C}}^*) \otimes \mathbb{C}T} \mathbb{C}v_{\tilde{\gamma}}.$$

Ce module admet clairement pour base $\{t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} : w \in W_A\}$, que l'on peut ordonner de façon compatible à la longueur dans W_A . D'après les formules de commutation dans $\mathbb{H}_B$, pour tous $\zeta \in V$, $x \in T$ et $w \in W_A$, il vient :

$$\zeta t_x . t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} = {}^w\tilde{\gamma}(\zeta x) t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} - \sum_{\alpha \in R(w^{-1})} {}^w\mu(\tilde{k}_{\alpha} x) < \alpha^{\vee}, \zeta > t_{s_{\alpha} w} \otimes v_{\tilde{\gamma}}.$$

Comme $\ell(s_{\alpha} w) < \ell(w)$ pour tout $\alpha \in R(w^{-1})$ les éléments de $V_{\mathbb{C}} \oplus \mathbb{C}T$ sont simultanément trigonalisés dans la base $\{t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} : w \in W_A\}$, et les poids de $M(\tilde{\gamma})$ sont les $\{{}^w\tilde{\gamma} : w \in W_A\}$.

La propriété suivante montre que l'étude des $\mathbb{H}_B$ -modules simples se ramène à l'étude des modules de la série principale sur $\mathbb{H}_B$.

Proposition 2.1. *Soit M un $\mathbb{H}_B$ -module irréductible et $\tilde{\gamma}$ un poids de M . Alors M est un quotient de $M(\tilde{\gamma})$. En particulier, un $\mathbb{H}_B$ -module simple est de dimension au plus $|W_A|$.*

Démonstration. Soit $m_{\tilde{\gamma}} \in M_{\tilde{\gamma}} \setminus \{0\}$; alors $\mathbb{C}m_{\tilde{\gamma}}$ est un $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T$ -module irréductible isomorphe à $\mathbb{C}v_{\tilde{\gamma}}$. Comme l'induction est le foncteur adjoint de la restriction, il existe un unique morphisme de $\mathbb{H}_B$ -modules de $M(\tilde{\gamma})$ dans M envoyant $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ sur $m_{\tilde{\gamma}}$. Puisque M est irréductible ce morphisme est surjectif et M est un quotient de $M(\tilde{\gamma})$. $\square$

Rappelons que l'on peut munir le dual de $M \in \mathbb{H}_B\text{-mod}$ d'une structure de $\mathbb{H}_B$ -module grâce à l'anti-automorphisme ι , et que l'on peut « tordre » M par δ , cf. 1.6. Nous désignerons par w_0 l'élément de plus grande longueur de W_A . Pour tout $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \mu \in \mathcal{A}$ on pose

$$\tilde{\gamma}^* = (-{}^{w_0}\gamma) \otimes (-{}^{w_0}\mu).$$

Proposition 2.2. *Soit $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \mu \in \mathcal{A}$. Alors :*

$${}^{\delta}M(\tilde{\gamma}) \simeq M(\gamma \otimes (-\mu)), \quad M(\tilde{\gamma})^* \simeq M(\tilde{\gamma}^*).$$

Tout $\mathbb{H}_B$ -module irréductible est un sous-module d'un module de la série principale.

Démonstration. Il est clair que ${}^{\delta}M(\tilde{\gamma})$ est engendré par $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$. De plus, $\delta(\xi).1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = \xi.1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = \gamma(\xi).1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ et $\delta(t_x).1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = \text{sgn}(x)t_x.1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = \text{sgn}(x)\mu(x).1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = (-\mu)(x).1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$, pour $\xi \in V, x \in T$. La propriété universelle de $M(\gamma \otimes (-\mu))$ fournit alors une surjection $M(\gamma \otimes (-\mu)) \rightarrow {}^{\delta}M(\tilde{\gamma})$, qui est un isomorphisme (puisque ces modules sont de même dimension).

Pour tout $w \in W_A$, notons $f_{w, \tilde{\gamma}} \in M(\tilde{\gamma})^*$ la forme linéaire définie par

$$< f_{w, \tilde{\gamma}}, t_u \otimes v_{\tilde{\gamma}} > = \begin{cases} \text{sgn}(w) & \text{si } u = w; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a donc $M(\tilde{\gamma})^* = \bigoplus_{w \in W_A} \mathbb{C} f_{w, \tilde{\gamma}}$ et un calcul facile montre que $t_g \cdot f_{w, \tilde{\gamma}} = f_{gw, \tilde{\gamma}}$ pour tout $g \in W_A$. Il en découle que $M(\tilde{\gamma})^* = \mathbb{H}_B \cdot f_{w_0, \tilde{\gamma}}$. Si l'on montre que $f_{w_0, \tilde{\gamma}}$ est de poids $\tilde{\gamma}^*$, on obtiendra une surjection $M(\tilde{\gamma}^*) \rightarrow M(\tilde{\gamma})^*$ qui donnera l'isomorphisme voulu.

Soient $\xi \in V, w \in W_A$; observons que le Lemme 1.4 implique $-\xi \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} = -\gamma(w^{-1}(\xi)) \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} + \sum_{u \in W_A, \ell(u) < \ell(w)} \lambda_u \cdot t_u \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ avec $\lambda_u \in \mathbb{C}$. On a donc $\langle \xi \cdot f_{w_0, \tilde{\gamma}}, t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} \rangle = 0$ sauf si $w = w_0$, auquel cas on trouve $-\gamma(w_0(\xi)) \operatorname{sgn}(w_0) = -^{w_0}\gamma(\xi) \operatorname{sgn}(w_0)$. Par conséquent $\xi \cdot f_{w_0, \tilde{\gamma}} = -^{w_0}\gamma(\xi) f_{w_0, \tilde{\gamma}}$.

Soit maintenant $x \in T$. On a $\langle t_x \cdot f_{w_0, \tilde{\gamma}}, t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} \rangle = \langle f_{w_0, \tilde{\gamma}}, \operatorname{sgn}(x) t_x \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} \rangle$. Mais de $\operatorname{sgn}(x) t_x \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} = \operatorname{sgn}(x) t_w \otimes (t_{w^{-1}xw} \cdot v_{\tilde{\gamma}}) = \operatorname{sgn}(x) \mu(w^{-1}xw) \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} = -^w\mu(x) \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ on tire que $\langle t_x \cdot f_{w_0, \tilde{\gamma}}, t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} \rangle$ est nul sauf pour $w = w_0$, auquel cas on obtient $-^{w_0}\mu(x) \operatorname{sgn}(w_0)$. Donc $t_x \cdot f_{w_0, \tilde{\gamma}} = -^{w_0}\mu(x) f_{w_0, \tilde{\gamma}}$.

La dernière assertion résulte du résultat précédent, de la Proposition 2.1, et des propriétés générales sur la dualité rappelées en 1.6. $\square$

Proposition 2.3. *Soient $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \mu \in \mathcal{A}$ et $w \in W_A$. Il existe un isomorphisme de $\mathbb{H}_B$ -modules*

$$M(\tilde{\gamma}) \xrightarrow{\sim} {}^wM(\tilde{\gamma}), \quad t_g \otimes v_{\tilde{\gamma}} \mapsto t_{wg} \otimes v_{\tilde{\gamma}}.$$

Démonstration. Considérons l'élément $t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ de ${}^wM(\tilde{\gamma})$. Puisque $t_{w^{-1}u} \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} = t_u \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ pour tout $u \in W_A$, cet élément engendre le $\mathbb{H}_B$ -module ${}^wM(\tilde{\gamma})$. Rappelons (cf. Lemme 1.4) que pour tout $\eta \in V_{\mathbb{C}}$ on a

$$\operatorname{Int}(w)(\eta) = w(\eta) + \sum_{\alpha \in R(w^{-1})} \langle \alpha^\vee, w(\eta) \rangle \tilde{k}_\alpha t_{s_\alpha},$$

ou encore

$$\eta t_w = t_w w^{-1}(\eta) - \sum_{\alpha \in R(w^{-1})} \langle \alpha^\vee, \eta \rangle \tilde{k}_\alpha t_{s_\alpha w}.$$

Si $\xi \in V_{\mathbb{C}}$ il vient donc, dans ${}^wM(\tilde{\gamma})$,

$$\begin{aligned} \xi \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} &= w(\xi) t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} + \sum_{\alpha \in R(w^{-1})} \langle \alpha^\vee, w(\xi) \rangle \tilde{k}_\alpha t_{s_\alpha w} \otimes v_{\tilde{\gamma}} \\ &= t_w \xi \otimes v_{\tilde{\gamma}} - \sum_{\alpha \in R(w^{-1})} \langle \alpha^\vee, w(\xi) \rangle \tilde{k}_\alpha t_{s_\alpha w} \otimes v_{\tilde{\gamma}} + \sum_{\alpha \in R(w^{-1})} \langle \alpha^\vee, w(\xi) \rangle \tilde{k}_\alpha t_{s_\alpha w} \otimes v_{\tilde{\gamma}} \\ &= \gamma(\xi) t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}. \end{aligned}$$

D'autre part si $x \in T$ on a : $t_x \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} = t_w t_x \otimes v_{\tilde{\gamma}} = \mu(x) t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$. Ainsi $t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} \in {}^wM(\tilde{\gamma})$ est de poids $\tilde{\gamma}$. La propriété universelle de $M(\tilde{\gamma})$ fournit un morphisme surjectif de $M(\tilde{\gamma})$ sur le $\mathbb{H}_B$ -module $\mathbb{H}_B \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} = {}^wM(\tilde{\gamma})$, déterminé par $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} \mapsto t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$; par conséquent $t_g \otimes v_{\tilde{\gamma}} \mapsto t_g \cdot t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} = t_{wg} \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ pour tout $g \in W_A$. Comme $\dim M(\tilde{\gamma}) = \dim {}^wM(\tilde{\gamma})$ ce morphisme est bijectif. $\square$

Soient $\mathbb{H}_{gr}(c) = \mathbb{H}_{gr}(c, S)$ une algèbre de Hecke graduée comme au § 1.1 et $M(\lambda)$ le $\mathbb{H}_{gr}(c)$ -module de la série principale associé à $\lambda \in V_{\mathbb{C}}^*$. Pour tout $w \in W$ on peut tordre $M(\lambda)$ par $\operatorname{Int}(w) \in \operatorname{Aut}_{\mathbb{C}}(\mathbb{H}_{gr}(c))$ et obtenir le module ${}^wM(\lambda)$. Avec ces notations, une preuve identique à celle de la proposition précédente donne :

Proposition 2.4. *Soient $\lambda \in V_{\mathbb{C}}^*$ et $w \in W$. Il existe un isomorphisme de $\mathbb{H}_{gr}(c)$ -modules*

$$M(\lambda) \xrightarrow{\sim} {}^wM(\lambda), \quad t_g \otimes v_\lambda \mapsto t_{wg} \otimes v_\lambda.$$

Remarque 2.5. Rappelons [5, Proposition 2.8] que si le $\mathbb{H}_{gr}(c)$ -module $M(\lambda)$ est simple, il en est de même de $M({}^w\lambda)$ pour tout $w \in W$. Si $\lambda, \gamma \in V_{\mathbb{C}}^*$ sont quelconques, l'existence d'un isomorphisme $M(\lambda) \simeq M(\gamma)$ force $\gamma \in W.\lambda = \{{}^w\lambda : w \in W\}$ (car γ est alors un poids de $M(\lambda)$). Par conséquent sous l'hypothèse $M(\lambda)$ simple, la condition $M(\lambda) \simeq M(\gamma)$ est équivalente à $\gamma \in W.\lambda$.

3. CRITÈRE D'IRRÉDUCTIBILITÉ

3.1. Notations. Pour tout $\tilde{\nu} \in \mathcal{A}$ on désignera par $\psi : \mathbb{H}_B \rightarrow \text{End } M(\tilde{\nu})$ la représentation $\mathbb{H}_B$ dans $M(\tilde{\nu})$. S'il n'y a pas risque d'ambiguïté, l'action de $a \in \mathbb{H}_B$ sur $v \in M(\tilde{\nu})$ sera simplement notée $a.v = \psi(a)(v)$. Soit $\varpi \in T^\vee$; rappelons que $W_A(\varpi)$ est le stabilisateur de ϖ dans W_A . On notera $\mathbb{H}_B(\varpi)$ la sous-algèbre de $\mathbb{H}_B$ engendrée par V , $W_A(\varpi)$ et T .

On fixe un caractère $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \mu \in \mathcal{A}$ et un système de représentants $\{w_1 = \text{id}, w_2, \dots, w_s\}$ de $W_A/W_A(\mu)$.

Remarque 3.1. Les caractères ${}^w\mu$, $j = 1, \dots, s$ sont deux à deux distincts. Par un argument classique il en découle que les formes linéaires ${}^w\mu \in (\mathbb{C}T)^*$ sont linéairement indépendantes. On peut ainsi trouver des éléments $y_i \in T$, $i = 1, \dots, s$, tels que la matrice $[{}^w\mu(t_{y_i})]_{1 \leq i, j \leq s}$ est inversible.

Pour tout $j \in \{1, \dots, s\}$, on définit un sous-espace vectoriel de $M(\tilde{\gamma})$ par :

$$E_j(\tilde{\gamma}) = \bigoplus_{w \in W_A(\mu)} \mathbb{C} t_{w_j} t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}.$$

Observons que

$$E_1(\tilde{\gamma}) = \bigoplus_{w \in W_A(\mu)} \mathbb{C} t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}, \quad E_j(\tilde{\gamma}) = t_{w_j}.E_1(\tilde{\gamma}).$$

On a $M(\tilde{\gamma}) = \bigoplus_{j=1}^s E_j(\tilde{\gamma})$ et cette décomposition est la décomposition isotypique du T -module $M(\tilde{\gamma})$: le groupe T opère sur $E_j(\tilde{\gamma})$ par le caractère ${}^w\mu$.

Soit $i \in \{1, \dots, n\}$ et $j_1 < j_2 < \dots < j_i$, $j_{i+1} < \dots < j_n$ la partition de $\{1, \dots, n\}$ telle que $\mu(t_{j_s}) = 1$ pour $s \in \{1, \dots, i\}$ et $\mu(t_{j_s}) = -1$ pour $s \in \{i+1, \dots, n\}$. Soit $\sigma \in W_A$ la permutation telle que $\sigma * j_p = p$ pour $p \in \{1, \dots, n\}$. Observons que pour $p < q$, $\sigma^{-1}(\alpha_{p,q}) = \alpha_{j_p, j_q} \in R_A^-$ si et seulement si $j_p > j_q$, ce qui implique $1 \leq p \leq i < q \leq n$. Donc $R(\sigma^{-1})$ est contenu dans $\{\alpha_{p,q} : 1 \leq p \leq i < q \leq n\}$. Par conséquent

$$(3.1) \quad R(\sigma) = -\sigma^{-1}(R(\sigma^{-1})) \subset \{\alpha_{j_q, j_p} : 1 \leq p \leq i < q \leq n\}.$$

On pose

$$\mu_i = \sigma \mu.$$

Alors, $W_A(\mu_i)$ est le groupe de Weyl $W(R_i)$ associé au système de racines R_i de type $A_{i-1} \times A_{n-i-1}$, de base $S_i = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_{n-1}\}$. Donc $W_A(\mu) = \sigma W_A(\mu_i) \sigma^{-1} = W_A(\sigma(R_i))$ admet pour base de racines simples

$$S(\mu) = \{\alpha_{j_1, j_2}, \dots, \alpha_{j_{i-1}, j_i}, \alpha_{j_{i+1}, j_{i+2}}, \dots, \alpha_{j_{n-1}, j_n}\}.$$

On notera ℓ_μ la longueur sur $W_A(\mu)$ associée à $S(\mu)$.

3.2. Restriction à $E_1(\tilde{\gamma})$. Rappelons (voir 1.6) que si $M \in \mathbb{H}_B\text{-mod}$ et $w \in W_A$, wM est le $\mathbb{H}_B$ -module tordu par l'action de $\text{Int}(w)$.

Proposition 3.2. *Soit $w \in W_A$. On suppose que $\mu(\tilde{k}_\alpha) = 0$ pour tout $\alpha \in R(w^{-1})$. Alors l'application $\phi : M({}^{w^{-1}}\tilde{\gamma}) \rightarrow {}^wM(\tilde{\gamma})$, donnée par $\phi(t_g \otimes v_{w^{-1}\tilde{\gamma}}) = t_{wgw^{-1}} \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ pour tout $g \in W_A$, est un isomorphisme de $\mathbb{H}_B$ -modules.*

Démonstration. Comme l'espace vectoriel $M(\tilde{\gamma}) = {}^wM(\tilde{\gamma})$ admet pour base $\{t_g \otimes v_{\tilde{\gamma}} = t_{w^{-1}gw} \cdot (1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}, g \in W\}$, le vecteur $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ engendre ${}^wM(\tilde{\gamma})$. Dans ${}^wM(\tilde{\gamma})$ le groupe T agit sur $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ par le caractère ${}^{w^{-1}}\mu$; de plus, pour tout $\zeta \in V$, il vient en utilisant le Lemme 1.4 :

$$\zeta \cdot 1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = t_w \zeta t_{w^{-1}} \cdot 1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = \left(w(\zeta) + \sum_{\alpha \in R(w^{-1})} \langle \alpha^\vee, w(\zeta) \rangle t_{s_\alpha} \tilde{k}_\alpha \right) \cdot 1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = {}^{w^{-1}}\gamma(\zeta) \cdot 1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$$

puisque $\tilde{k}_\alpha \cdot 1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = \mu(\tilde{k}_\alpha) \cdot 1 \otimes v_{\tilde{\gamma}} = 0$ pour tout $\alpha \in R(w^{-1})$. Donc $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ est de poids ${}^{w^{-1}}\tilde{\gamma}$ dans ${}^wM(\tilde{\gamma})$. Par la propriété universelle de l'induction, il existe un unique $\mathbb{H}_B$ -morphisme surjectif ϕ de $M({}^{w^{-1}}\tilde{\gamma})$ dans ${}^wM(\tilde{\gamma})$, qui envoie $1 \otimes v_{w^{-1}\tilde{\gamma}}$ sur $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$. Ces deux modules étant de dimension $|W_A|$, ϕ est bijectif. Enfin, pour tout $g \in W_A$ on a

$$\phi(t_g \otimes v_{w^{-1}\tilde{\gamma}}) = \phi(t_g \cdot (1 \otimes v_{w^{-1}\tilde{\gamma}})) = t_g \cdot \phi(1 \otimes v_{w^{-1}\tilde{\gamma}}) = t_{wgw^{-1}} \cdot (1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}) = t_{wgw^{-1}} \otimes v_{\tilde{\gamma}},$$

ce qui démontre la proposition. $\square$

Corollaire 3.3. (1) *On a $\mu(\tilde{k}_\alpha) = 0$ pour tout $\alpha \in R(\sigma)$ et l'application $\phi : M(\sigma\tilde{\gamma}) \rightarrow \sigma^{-1}M(\tilde{\gamma})$ donnée par $\phi(t_g \otimes v_{\sigma\tilde{\gamma}}) = t_{\sigma^{-1}g\sigma} \otimes v_{\tilde{\gamma}}$, pour tout $g \in W_A$, est un isomorphisme de $\mathbb{H}_B$ -modules.*
(2) *Il existe un isomorphisme*

$$\sigma\phi : M(\sigma\tilde{\gamma}) \xrightarrow{\sim} M(\tilde{\gamma})$$

tel que $\sigma\phi(t_g \otimes v_{\sigma\tilde{\gamma}}) = t_{g\sigma} \otimes v_{\tilde{\gamma}}$.

Démonstration. (1) Par (3.1) on sait que toute racine $\alpha \in R(\sigma)$ s'écrit α_{j_q, j_p} avec $1 \leq p \leq i < q \leq n$. Par conséquent $\mu(\tilde{k}_\alpha) = 1 + \mu(t_{j_p})\mu(t_{j_q}) = 0$. Il suffit donc d'appliquer la proposition précédente à $w = \sigma^{-1}$.

(2) La Proposition 2.3 fournit un isomorphisme de $\sigma^{-1}M(\tilde{\gamma})$ sur $M(\tilde{\gamma})$ qui envoie $t_u \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ sur $t_{\sigma u} \otimes v_{\tilde{\gamma}}$; en le composant avec ϕ on obtient l'isomorphisme $\sigma\phi$ voulu. $\square$

Le (2) du Corollaire 3.3 montre que l'étude du module $M(\tilde{\gamma})$ est équivalente à celle de $M(\sigma\tilde{\gamma})$. Nous verrons que $E_1(\tilde{\gamma})$ hérite d'une structure de $\mathbb{H}_B(\mu)$ -module déterminant celle de $M(\tilde{\gamma})$ (cf. Proposition 3.10); il est donc naturel de comparer les modules $E_1(\tilde{\gamma})$ et $E_1(\sigma\tilde{\gamma})$, ce que nous ferons au Théorème 3.5.

Observons que, puisque $W_A(\sigma\mu) = \sigma W_A(\mu) \sigma^{-1}$, l'application ϕ du Corollaire 3.3 donne un isomorphisme d'espaces vectoriels

$$\phi : E_1(\sigma\tilde{\gamma}) \rightarrow E_1(\tilde{\gamma}).$$

Lemme 3.4. *La restriction de ψ à $\mathbb{H}_B(\mu)$ munit $E_1(\tilde{\gamma})$ d'une structure de $\mathbb{H}_B(\mu)$ -module.*

Démonstration. L'espace $E_1(\tilde{\gamma})$ est évidemment stable sous l'action de T et de $W_A(\mu)$. Il reste donc à montrer qu'il est stable sous l'action de V ; puisque les éléments de V et T commutent dans $\mathbb{H}_B$, ceci résulte du fait que $E_1(\tilde{\gamma})$ est la composante isotypique de type μ du T -module $M(\tilde{\gamma})$. Afin d'expliquer le rôle que va jouer l'algèbre de Hecke graduée $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$ au § 3.3 nous donnons ci-dessous une autre preuve de ce fait.

Soient $\zeta \in V$, $w \in W_A(\mu)$, et montrons par récurrence sur $\ell_\mu(w)$ que $\zeta.t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} \in E_1(\tilde{\gamma})$. En choisissant une décomposition réduite de w dans $W_A(\mu)$ on peut écrire $w = s_{j_l, j_{l+1}} u$ avec $l \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ et $u \in W_A(\mu)$ tel que $\ell_\mu(u) < \ell_\mu(w)$. Par définition des entiers j_r on a, pour tout $j \in \{j_l + 1, \dots, j_{l+1} - 1\}$, $\mu(t_j) = -\mu(t_{j_l}) = -\mu(t_{j_{l+1}})$. Donc $\mu(\tilde{k}_{j_l, j}) = \mu(\tilde{k}_{j, j_{l+1}}) = 0$ et $\mu(\tilde{k}_{j_l, j_{l+1}}) = 2k$. Comme $\mu(\tilde{k}_{u^{-1}(i), u^{-1}(j)}) = {}^u\mu(\tilde{k}_{i, j}) = \mu(\tilde{k}_{i, j})$ et que $v_{\tilde{\gamma}}$ est de poids μ , le Lemme 1.4 appliqué à $s_{p, q} = s_{j_l, j_{l+1}}$ fournit :

$$\zeta.t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} = t_{s_{p, q}}.(s_{p, q}(\zeta).t_u \otimes v_{\tilde{\gamma}}) - 2k < \alpha_{p, q}^\vee, \zeta > t_u \otimes v_{\tilde{\gamma}}.$$

Par récurrence on a $s_{p, q}(\zeta).t_u \otimes v_{\tilde{\gamma}} \in E_1(\tilde{\gamma})$, d'où $\zeta.t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} \in E_1(\tilde{\gamma})$. $\square$

En appliquant le Lemme 3.4 avec $\sigma\tilde{\gamma}$ à la place de $\tilde{\gamma}$, on obtient que $E_1(\sigma\tilde{\gamma})$ hérite naturellement (via ψ) d'une structure de $\mathbb{H}_B(\sigma\mu)$ -module. Nous allons maintenant transporter cette structure à $E_1(\tilde{\gamma})$ grâce à l'isomorphisme (d'espaces vectoriels) ϕ obtenu ci-dessus.

Théorème 3.5. (1) *Il existe un morphisme d'algèbres*

$$\rho : \mathbb{H}_B(\sigma\mu) \rightarrow \text{End } E_1(\tilde{\gamma})$$

défini par $\rho(\xi) = \psi(\sigma^{-1}(\xi))$, $\rho(t_w) = \psi(t_{\sigma^{-1}w\sigma})$, pour $\xi \in V$, $w \in T \rtimes W_A(\sigma\mu)$, qui donne une structure de $\mathbb{H}_B(\sigma\mu)$ -module sur l'espace vectoriel $E_1(\tilde{\gamma})$. Pour cette structure, notée $E_1^\sigma(\tilde{\gamma})$, on a un isomorphisme de $\mathbb{H}_B(\sigma\mu)$ -modules

$$\varphi : E_1(\sigma\tilde{\gamma}) \xrightarrow{\sim} E_1^\sigma(\tilde{\gamma})$$

donné par $\varphi(t_g \otimes v_{\sigma\tilde{\gamma}}) = t_{\sigma^{-1}g\sigma} \otimes v_{\tilde{\gamma}}$, pour tout $g \in W_A(\sigma\mu)$.

(2) *Un sous-espace $N \subset E_1(\tilde{\gamma})$ est un sous- $\mathbb{H}_B(\mu)$ -module si et seulement si c'est un sous- $\mathbb{H}_B(\sigma\mu)$ -module de $E_1^\sigma(\tilde{\gamma})$.*

Démonstration. (1) Nous allons montrer que le morphisme ρ cherché n'est autre que $\psi \circ \text{Int}(\sigma^{-1})$ restreint à $\mathbb{H}_B(\sigma\mu)$. Observons tout d'abord que, par définition, $\psi(\text{Int}(\sigma^{-1})(t_w)) = \psi(t_{\sigma^{-1}w\sigma}) \in \text{End } E_1(\tilde{\gamma})$ pour tout $w \in T \rtimes W_A(\sigma\mu)$. Il suffit donc de vérifier que $\psi(\text{Int}(\sigma^{-1})(\xi)) = \psi(\sigma^{-1}(\xi))$ sur $E_1(\tilde{\gamma})$ pour tout $\xi \in V$. Pour ce faire, calculons $\psi(\text{Int}(\sigma^{-1})(\xi)) = \psi(t_{\sigma^{-1}}\xi t_\sigma)$ sur un élément $v \in E_1(\tilde{\gamma})$. Comme dans la preuve de la Proposition 3.2 on obtient :

$$t_{\sigma^{-1}}\xi t_\sigma.v = \left(\sigma^{-1}(\zeta) + \sum_{\alpha \in R(\sigma)} < \alpha^\vee, \sigma^{-1}(\zeta) > t_{s_\alpha} \tilde{k}_\alpha \right).v = \sigma^{-1}(\zeta).v$$

puisque $\tilde{k}_\alpha.v = \mu(\tilde{k}_\alpha).v = 0$ pour tout $\alpha \in R(\sigma)$ par le Corollaire 3.3 (on rappelle que $\mathbb{C}T$ opère par μ sur $E_1(\tilde{\gamma})$).

Il est clair que φ est la bijection linéaire $\phi : E_1(\sigma\tilde{\gamma}) \rightarrow E_1(\tilde{\gamma})$ précédente. Il reste alors à vérifier que $\phi(a.y) = \rho(a)(\phi(y))$ pour tous $a \in \mathbb{H}_B(\sigma\mu)$, $y \in E_1(\sigma\tilde{\gamma})$. Mais, par le Corollaire 3.3, on a $\phi(a.y) = a \cdot \phi(y) = \psi(\text{Int}(\sigma^{-1})(a))(y) = \rho(a)(y)$.

(2) Observons que N est un sous- $\mathbb{H}_B(\mu)$ -module de $E_1(\tilde{\gamma})$ si, et seulement si, $\{\xi.N \subset N, t_w.N \subset N\}$ pour tous $\xi \in V$, $w \in T \rtimes W_A(\mu)$. Ceci équivaut à $\{\sigma^{-1}(\xi).N \subset N, t_{\sigma^{-1}(\sigma w \sigma^{-1})\sigma}.N \subset N\}$. Compte tenu de (1), cette condition s'écrit encore $\{\rho(\xi)(N) \subset N, \rho(t_{w'}) (N) \subset N\}$ pour tous $\xi \in V$, $w' \in T \rtimes W_A(\sigma\mu)$ (puisque $T \rtimes W_A(\sigma\mu) = \sigma(T \rtimes W_A(\mu))\sigma^{-1}$), ce qui signifie que N est un sous- $\mathbb{H}_B(\sigma\mu)$ -module de $E_1^\sigma(\tilde{\gamma})$. $\square$

Corollaire 3.6. *On adopte les notations de 1.6 et du Théorème 3.5. Alors :*

$$\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\mu)}(E_1(\tilde{\gamma})) \cong \mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\sigma\mu)}(E_1(\sigma\tilde{\gamma})), \quad \text{lg}_{\mathbb{H}_B(\mu)} E_1(\tilde{\gamma}) = \text{lg}_{\mathbb{H}_B(\sigma\mu)} E_1(\sigma\tilde{\gamma}).$$

Démonstration. Par le (2) du Théorème 3.5 on sait que $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\mu)}(E_1(\tilde{\gamma})) = \mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\sigma\mu)}(E_1^\sigma(\tilde{\gamma}))$, et par le (1) du même théorème on obtient $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\sigma\mu)}(E_1(\sigma\tilde{\gamma})) \cong \mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\sigma\mu)}(E_1^\sigma(\tilde{\gamma}))$. D'où le corollaire. $\square$

3.3. Cas $\mu = \mu_i$. On suppose dans cette section que $\tilde{\nu} \in \mathcal{A}$ est de la forme $\nu \otimes \mu_i$. On note $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$ l'algèbre de Hecke graduée associée au système de racines R_i de V et à la multiplicité $c = 2k$. Pour $\nu \in V_{\mathbb{C}}^*$, $M_i(\nu)$ désignera le module de la série principale sur $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$ associé à ν (noté $M(\nu)$ en 1.1).

Soit $I = \text{Ker}(\mu_i)$ l'idéal de $\mathbb{C}T$ engendré par les $x - \mu_i(x)$, $x \in T$. Comme les éléments de V commutent à ceux de T , l'idéal à gauche $\mathbb{H}_B(\mu_i)I$ est bilatère ; on peut donc définir l'algèbre quotient

$$\overline{\mathbb{H}_B(\mu_i)} = \mathbb{H}_B(\mu_i) \otimes_{\mathbb{C}T} (\mathbb{C}T/I) = \mathbb{H}_B(\mu_i)/\mathbb{H}_B(\mu_i)I.$$

Le groupe $W_A(\mu_i)$ étant engendré par les réflexions simples s_{α_p} , $\alpha_p \in S_i$, il résulte de (1.1) et de (PBW3) que $\mathbb{H}_B(\mu_i) = S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W_A(\mu_i) \otimes \mathbb{C}T$. Puisque $\overline{\mathbb{C}T/I}$ est un T -module de dimension 1 (de caractère μ_i), on a un isomorphisme de $S(V_{\mathbb{C}})$ -modules $\overline{\mathbb{H}_B(\mu_i)} \simeq S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W_A(\mu_i)$.

Remarquons que pour tout $j \neq i$ on a $\mu_i(t_j) = \mu_i(t_{j+1})$, donc $\mu_i(\bar{k}_j) = 2k$. Les relations de définition de $\mathbb{H}_B$ appliquées aux $\alpha_j \in S_i$ fournissent alors dans $\overline{\mathbb{H}_B(\mu_i)}$:

$$t_{s_{\alpha_j}}\zeta = s_{\alpha_j}(\zeta)t_{s_{\alpha_j}} - 2k < \alpha_j^\vee, \zeta >,$$

pour tout $\zeta \in V$. Ces relations coïncident avec celles définissant l'algèbre de Hecke graduée $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$. On en déduit un morphisme surjectif d'algèbres

$$F : \mathbb{H}_{gr}(\mu_i) \rightarrow \overline{\mathbb{H}_B(\mu_i)}$$

défini par $F(\zeta) = \zeta \pmod{\mathbb{H}_B(\mu_i)I}$ et $F(t_w) = t_w \pmod{\mathbb{H}_B(\mu_i)I}$ pour $\zeta \in V$, $w \in W_A(\mu_i)$. Puisque $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$ et $\overline{\mathbb{H}_B(\mu_i)}$ sont isomorphes à $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W_A(\mu_i)$ comme $S(V_{\mathbb{C}})$ -modules, F est un isomorphisme.

Observons que pour tout $\tilde{\nu} = \nu \otimes \mu_i \in \mathcal{A}$, T opère sur le $\mathbb{H}_B(\mu_i)$ -module $E_1(\tilde{\nu})$ par le caractère μ_i , donc $E_1(\tilde{\nu})$ peut être considéré comme un $\overline{\mathbb{H}_B(\mu_i)}$ -module.

Lemme 3.7. *L'application $f : M_i(\nu) \rightarrow E_1(\tilde{\nu})$ définie par $f(t_w \otimes v_\nu) = t_w \otimes v_{\tilde{\nu}}$ est un isomorphisme qui entrelace, via F , les actions de $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$ et $\overline{\mathbb{H}_B(\mu_i)}$.*

Démonstration. Grâce à l'isomorphisme F , $E_1(\tilde{\nu})$ hérite d'une structure de $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$ -module pour laquelle il est engendré par le vecteur $1 \otimes v_{\tilde{\nu}}$, qui est de poids ν sous l'action de $S(V_{\mathbb{C}})$. La propriété universelle de $M_i(\nu)$ assure donc l'existence et la surjectivité de l'opérateur d'entrelacement f . Comme $E_1(\tilde{\nu})$ et $M_i(\nu)$ sont de dimension $|W_A(\mu_i)|$, f est bijective. $\square$

On peut ainsi identifier le $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$ -module $M_i(\nu)$ et le $\mathbb{H}_B(\mu_i)$ -module $E_1(\tilde{\nu})$, il en résulte en particulier que :

$$(3.2) \quad \mathcal{L}_{\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)}(M_i(\nu)) \cong \mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\mu_i)}(E_1(\tilde{\nu})), \quad \text{lg}_{\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)} M_i(\nu) = \text{lg}_{\mathbb{H}_B(\mu_i)} E_1(\tilde{\nu}).$$

3.4. Critère d'irréductibilité. Rappelons que σ est tel que $\sigma\mu = \mu_i$. Donc en appliquant (3.2) à $\tilde{\nu} = \sigma\tilde{\gamma} = \sigma\gamma \otimes \mu_i$ et en utilisant le Corollaire 3.6 on obtient :

Proposition 3.8. *Mêmes notations. On a*

$$\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\mu)}(E_1(\tilde{\gamma})) \cong \mathcal{L}_{\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)}(M_i(\sigma\gamma)), \quad \text{lg}_{\mathbb{H}_B(\mu)} E_1(\tilde{\gamma}) = \text{lg}_{\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)} M_i(\sigma\gamma).$$

En particulier, $E_1(\tilde{\gamma})$ est un $\mathbb{H}_B(\mu)$ -module simple si et seulement si $M_i(\sigma\gamma)$ est un $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$ -module simple.

Rappelons que $\mathcal{S}_R(M)$ désigne la suite des sous-quotients simples d'un $M \in R\text{-mod}$, cf. 1.6, et que par [5, Proposition 2.8(c)] :

$$\mathcal{S}_{\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)}(M_i({}^\sigma\gamma)) = \mathcal{S}_{\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)}(M_i({}^{x\sigma}\gamma))$$

pour tout $x \in W_A(\mu_i)$.

Corollaire 3.9. *Soit $w \in W_A$. Alors :*

- *il existe une bijection $f : \mathcal{S}_{\mathbb{H}_B(\mu)}(E_1(\tilde{\gamma})) \rightarrow \mathcal{S}_{\mathbb{H}_B(w\mu)}(E_1({}^w\tilde{\gamma}))$ telle que $\dim f(Y) = \dim Y$ pour tout $Y \in \mathcal{S}_{\mathbb{H}_B(\mu)}(E_1(\tilde{\gamma}))$;*
- *$E_1(\tilde{\gamma})$ est un $\mathbb{H}_B(\mu)$ -module simple si et seulement si $E_1({}^w\tilde{\gamma})$ est un $\mathbb{H}_B(w\mu)$ -module simple.*

Démonstration. Il existe $\varsigma \in W_A$ tel que ${}^\varsigma w\mu = \mu_i$ et l'on peut écrire $\varsigma w = x\sigma$ pour un $x \in W_A(\mu_i)$. Par la Proposition 3.8 on sait que $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\mu)}(E_1(\tilde{\gamma})) \cong \mathcal{L}_{\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)}(M_i({}^\sigma\gamma))$ et $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(w\mu)}(E_1({}^w\tilde{\gamma})) \cong \mathcal{L}_{\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)}(M_i({}^{\varsigma w}\gamma))$, l'existence de f découle donc du rappel précédent. La deuxième assertion est alors évidente. $\square$

Nous allons maintenant montrer que les treillis ordonnés $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B}(M(\tilde{\gamma}))$ et $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\mu)}(E_1(\tilde{\gamma}))$ sont isomorphes. Remarquons tout d'abord que (PBW3) et $\mathbb{C}W_A(\mu) \otimes \mathbb{C}T \otimes S(V_{\mathbb{C}}) \subset \mathbb{H}_B(\mu)$ impliquent

$$\mathbb{H}_B = \mathbb{C}W_A \otimes \mathbb{C}T \otimes S(V_{\mathbb{C}}) = \left(\bigoplus_{j=1}^s t_{w_j} \mathbb{C}W_A(\mu) \right) \otimes \mathbb{C}T \otimes S(V_{\mathbb{C}}) \subset \sum_{j=1}^s t_{w_j} \mathbb{H}_B(\mu).$$

D'où :

$$(3.3) \quad \mathbb{H}_B = \sum_{j=1}^s t_{w_j} \mathbb{H}_B(\mu).$$

Proposition 3.10. *Le module $M(\tilde{\gamma})$ s'identifie à $\mathbb{H}_B \otimes_{\mathbb{H}_B(\mu)} E_1(\tilde{\gamma})$. Les applications $Y \rightarrow \mathbb{H}_B \otimes_{\mathbb{H}_B(\mu)} Y$ et $X \rightarrow X \cap E_1(\tilde{\gamma})$ sont des bijections réciproques de $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\mu)}(E_1(\tilde{\gamma}))$ sur $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B}(M(\tilde{\gamma}))$. On a en particulier :*

$$\text{lg}_{\mathbb{H}_B} M(\tilde{\gamma}) = \text{lg}_{\mathbb{H}_B(\mu)} E_1(\tilde{\gamma}).$$

Démonstration. Soit Y un sous- $\mathbb{H}_B(\mu)$ -module de $E_1(\tilde{\gamma})$. Puisque $M(\tilde{\gamma}) = \bigoplus_{j=1}^s t_{w_j} \cdot E_1(\tilde{\gamma})$, l'équation (3.3) entraîne que le sous-module de $M(\tilde{\gamma})$ engendré par Y est (comme sous-espace vectoriel) égal à

$$\mathbb{H}_B \cdot Y = \sum_{j=1}^s t_{w_j} \mathbb{H}_B(\mu) \cdot Y = \sum_{j=1}^s t_{w_j} \cdot Y = \bigoplus_{j=1}^s t_{w_j} \cdot Y.$$

Il en résulte que l'application surjective canonique

$$\pi : \mathbb{H}_B \otimes_{\mathbb{H}_B(\mu)} Y \rightarrow \mathbb{H}_B \cdot Y, \quad \pi(a \otimes y) = a \cdot y,$$

est un isomorphisme. En effet, supposons $u = \sum_{l=1}^p a_l \otimes u_l \in \text{Ker } \pi$. Écrivons $a_l = \sum_{j=1}^s t_{w_j} a_{jl}$ avec $a_{jl} \in \mathbb{H}_B(\mu)$. Il vient $\pi(u) = \sum_{j,l} t_{w_j} a_{jl} \cdot u_l = \sum_{j=1}^s t_{w_j} \cdot (\sum_{l=1}^p a_{jl} \cdot u_l) = 0$ avec $\sum_{l=1}^p a_{jl} \cdot u_l \in Y$. Donc $\sum_{l=1}^p a_{jl} \cdot u_l = 0$ pour tout j et

$$u = \sum_{j,l} t_{w_j} \otimes a_{jl} \cdot u_l = \sum_j t_{w_j} \otimes (\sum_l a_{jl} \cdot u_l) = 0.$$

Nous pouvons ainsi identifier $\mathbb{H}_B \otimes_{\mathbb{H}_B(\mu)} Y$ et $\mathbb{H}_B \cdot Y$. Le foncteur $Y \rightarrow \mathbb{H}_B \otimes_{\mathbb{H}_B(\mu)} Y$ fournit donc une application injective (qui préserve les inclusions) de $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B(\mu)}(E_1(\tilde{\gamma}))$ dans $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_B}(M(\tilde{\gamma}))$. Pour démontrer la proposition il nous reste à voir que tout sous-module X de $M(\tilde{\gamma})$ est de la forme $\mathbb{H}_B \otimes_{\mathbb{H}_B(\mu)} (X \cap E_1(\tilde{\gamma}))$. Soit $x \in X$, que l'on écrit $x = \sum_{j=1}^s t_{w_j} \cdot x_j$ avec $x_j \in E_1(\tilde{\gamma})$ pour tout j .

Par la Remarque 3.1 il existe des $y_i \in T$ tels que la matrice $[{}^w\mu(t_{y_i})]_{i,j}$ est inversible. Puisque T opère sur $t_{w_j}.x_j$ par le caractère ${}^w\mu$, en appliquant les t_{y_i} à x on obtient que $t_{w_j}.x_j \in \mathbb{C}T.x \subset X$ pour tout j . Il en résulte que $x_j \in X \cap E_1(\tilde{\gamma})$ et donc $X = \bigoplus_{j=1}^s t_{w_j}.(X \cap E_1(\tilde{\gamma}))$, comme voulu. $\square$

Observons que la proposition précédente assure que $M(\tilde{\gamma})$ est simple si et seulement si $E_1(\tilde{\gamma})$ l'est. Nous pouvons maintenant en déduire un critère d'irréductibilité pour les modules $M(\tilde{\gamma})$. Rappelons que $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \mu \in \mathcal{A}$ et que $\sigma \in W_A$ est a été introduit en 3.1 de sorte que $\mu_i = {}^\sigma\mu$. Comme dans [5, Theorem 2.10] on pose pour tout $\nu \in V_{\mathbb{C}}^*$:

$$P_i(\nu) = \{\alpha \in R_i^+ : \nu(\alpha) = \pm 2k\}.$$

Théorème 3.11. *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (i) $M(\tilde{\gamma})$ est un $\mathbb{H}_B$ -module simple ;
- (ii) $M({}^w\tilde{\gamma})$ est un $\mathbb{H}_B$ -module simple pour tout $w \in W_A$;
- (iii) $P_i(\sigma\gamma) = \emptyset$.

Démonstration. Par [5, Theorem 2.10] on sait que le $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$ -module $M_i(\sigma\gamma)$ est simple si et seulement si $P_i(\sigma\gamma) = \emptyset$. Le théorème découle donc de la combinaison de la Proposition 3.8, du Corollaire 3.9 et de la Proposition 3.10 (appliquée à $\tilde{\gamma}$ et ${}^w\tilde{\gamma}$). $\square$

4. APPLICATION À UN SYSTÈME DE RACINES DE TYPE D_n

On définit dans cette section une sous-algèbre $\mathbb{H}_D$ de $\mathbb{H}_B$ dont l'étude des représentations se déduit du travail précédent. Elle peut se réaliser dans l'algèbre de Cherednik rationnelle de type D_n : cette sous-algèbre est isomorphe à l'algèbre $\mathbb{D}$ de l'introduction pour un système de racines de type D_n .

4.1. L'algèbre $\mathbb{H}_D$. Rappelons que le système de racines R_B contient le système de racines R_D suivant, de type D_n et de base $S_D = \{\alpha_i = \epsilon_i - \epsilon_{i+1}, 1 \leq i \leq n-1; \epsilon_{n-1} + \epsilon_n\}$:

$$R_D = \{\pm\epsilon_i \pm \epsilon_j : 1 \leq i, j \leq n\} \supset R_D^+ = \{\epsilon_i \pm \epsilon_j : 1 \leq i < j \leq n\}.$$

Le groupe de Weyl W_D associé est égal à $U \rtimes W_A$, où U est le sous-groupe de T engendré par les $s_{\epsilon_i} s_{\epsilon_{i+1}}$ pour $1 \leq i \leq n-1$. Observons que, puisque $k \neq 0$, on a $\mathbb{C}U = \mathbb{C}[\tilde{k}_{\alpha_i} : 1 \leq i \leq n-1]$. Rappelons que l'automorphisme δ envoie t_i sur $-t_i$; on a donc aussi $\mathbb{C}U = (\mathbb{C}T)^\delta = \{a \in \mathbb{C}T : \delta(a) = a\}$. (Dans toute la suite on notera $(\)^\delta$ l'espace des δ -invariants.)

On pose

$$\mathbb{H}_D = \mathbb{H}_B^\delta = \{h \in \mathbb{H}_B : \delta(h) = h\}.$$

Comme $\mathbb{H}_B = S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W_A \otimes \mathbb{C}T$ (par (PBW3)) et que δ est l'identité sur $S(V_{\mathbb{C}})$ et $\mathbb{C}W_A$ on a (PBW4)

$$\mathbb{H}_D = S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W_A \otimes \mathbb{C}U.$$

D'autre part les relations (a), (b), (c) et l'équation (1.1) du § 1.2 montrent que

$$\mathbb{H}_D = \mathbb{C}\langle \xi \in V; w \in W_D \rangle = \mathbb{C}\langle \xi \in V; t_{s_{\alpha_i}}, i = 1, \dots, n-1 \rangle.$$

Le calcul du centre de $\mathbb{H}_D$ résulte de celui de $Z(\mathbb{H}_B)$ fait au § 1.5, dont on adopte les notations.

Théorème 4.1. *On a : $Z(\mathbb{H}_D) = S(V_{\mathbb{C}})^{W_A} \otimes (\mathbb{C}U)^{W_A} = \bigoplus_{i=0}^{[\frac{n}{2}]} S(V_{\mathbb{C}})^{W_A} \vartheta_{2i}$.*

Démonstration. Observons tout d'abord que $\delta(\vartheta_j) = (-1)^j \vartheta_j$, donc

$$(\mathbb{C}U)^{W_A} = \mathbb{C}U \cap (\mathbb{C}T)^{W_A} = (\mathbb{C}T)^\delta \cap (\mathbb{C}T)^{W_A} = \bigoplus_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \mathbb{C}\vartheta_{2i}.$$

Soit $c \in Z(\mathbb{H}_D)$, c'est à dire $c \in \mathbb{H}_D$ et $[c, V] = [t_{s_{\alpha_i}}, c] = 0$ pour $i = 1, \dots, n-1$. Par le Lemme 1.6 la condition $[c, V] = 0$ équivaut à $c \in (S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}T)^\delta = S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}U$. La preuve du Théorème 1.7 montre alors que $c \in Z(\mathbb{H}_D)$ si et seulement si $c \in Z(\mathbb{H}_B)^\delta = (\bigoplus_{j=0}^n S(V_{\mathbb{C}})^{W_A} \vartheta_j)^\delta = \bigoplus_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} S(V_{\mathbb{C}})^{W_A} \vartheta_{2i}$. $\square$

4.2. Réalisation dans l'algèbre de Cherednik. Rappelons (Théorème 1.3) l'existence de l'isomorphisme $\Phi : \mathbb{H}_B \rightarrow \mathbb{D}_B$ tel que $\Phi(\epsilon_j) = D_j = D_j^B$ et $\Phi(w) = w$ pour $w \in W_B$. Par restriction Φ induit donc un isomorphisme de $\mathbb{H}_D$ sur la sous-algèbre

$$\mathbb{D}_D = \mathbb{C}\langle D_1^B, \dots, D_n^B; w \in W_D \rangle = \mathbb{C}\langle D_1^B, \dots, D_n^B; w \in W_A \rangle.$$

On peut ainsi réaliser $\mathbb{D}_D$ comme sous-algèbre de l'algèbre de Cherednik $\mathcal{H}_B(\bar{k})$ de type B_n , où $\bar{k} = (k, k_c)$ comme au § 1.3. Notons que les relations de définition de $\mathbb{H}_B$ ne font intervenir la multiplicité $\bar{k}$ que par sa valeur k sur les racines longues. Ceci permet de réaliser $\mathbb{H}_D$ comme sous-algèbre de l'algèbre de Cherednik rationnelle $\mathcal{H}_D(k)$ de type D_n . En effet, choisissons pour multiplicité $\bar{k}_0 = (k, 0)$ (i.e. $\bar{k}$ nulle sur les racines courtes). L'opérateur de Dunkl $T_y^D(\bar{k}_0)$, pour $y \in \mathfrak{a}$, est alors

$$T_y^D(k) = \partial_y + \frac{k}{2} \sum_{\alpha \in R_D} \frac{\langle \alpha, y \rangle}{\alpha} (1 - t_{s_\alpha}),$$

qui est égal à l'opérateur de Dunkl défini par y pour le type D_n . L'algèbre de Cherednik $\mathcal{H}_D(k)$ étant engendrée, dans $\text{End}_{\mathbb{C}} S(\mathfrak{a}^*)$, par les $T_y^D(k)$, $y \in \mathfrak{a}$, $x \in \mathfrak{a}^*$ et t_w , $w \in W_D$, s'identifie donc à une sous-algèbre de $\mathcal{H}_B(\bar{k}_0)$. Il est clair que l'image $\Phi(\mathbb{H}_D)$ de l'isomorphisme précédent est alors contenue dans $\mathcal{H}_D(k)$ et coïncide avec la sous-algèbre $\mathbb{D}$ définie dans l'introduction.

4.3. Modules de la série principale. Notons $\mu \mapsto \bar{\mu}$ le morphisme (surjectif) de restriction entre les groupes de caractères $T^\vee$ et $U^\vee$. Les antécédents de $\bar{\mu} \in U^\vee$ sont donc μ et $-\mu = \text{sgn} \otimes \mu$. On désigne par $W_A(\bar{\mu}) = \{w \in W_A : {}^w \bar{\mu} = \bar{\mu}\}$ le stabilisateur de $\bar{\mu}$ dans W_A . Remarquons que ${}^w \bar{\mu} = \overline{{}^w \mu}$ pour tout $w \in W$ et que $W_A(\mu) \subset W_A(\bar{\mu})$. On définit deux sous-algèbres de $\mathbb{H}_D$ par

$$\mathbb{H}_D(\bar{\mu}) = \mathbb{C}\langle V, W_A(\bar{\mu}), U \rangle \supset \mathbb{H}_D(\mu) = \mathbb{C}\langle V, W_A(\mu), U \rangle.$$

Observons que le noyau $\bar{I}$ du caractère $\bar{\mu}$ engendre un idéal bilatère de $\mathbb{H}_D(\bar{\mu})$ et que l'on peut ainsi définir les algèbres quotients

$$\overline{\mathbb{H}_D(\bar{\mu})} = \mathbb{H}_D(\bar{\mu}) / \mathbb{H}_D(\bar{\mu})\bar{I}, \quad \overline{\mathbb{H}_D(\mu)} = \mathbb{H}_D(\mu) / \mathbb{H}_D(\mu)\bar{I}.$$

Fixons $\mu \in T^\vee$ et $\sigma \in W_A$ tel que $\sigma\mu = \mu_i$ comme au § 3.1. On a donc $W_A(\mu_i) = \sigma W_A(\mu) \sigma^{-1}$ et $W_A(\bar{\mu}_i) = \sigma W_A(\bar{\mu}) \sigma^{-1}$. Rappelons que $W_A(\mu_i)$ est le groupe de Weyl associé au système de racines R_i de type $A_{i-1} \times A_{n-i-1}$ de base $S_i = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_{n-1}\}$.

Lemme 4.2. (1) On a $W_A(\mu) \neq W_A(\bar{\mu})$ si et seulement si $n = 2m$ et $\sigma\mu = \mu_m$. Dans ce cas $W_A(\bar{\mu}_m) = W_A(\mu_m) \rtimes \langle w_0 \rangle$ où w_0 est l'élément le plus long de W_A .

(2) L'application $F : \mathbb{H}_{gr}(\mu_i) \rightarrow \overline{\mathbb{H}_D(\mu_i)}$ définie par $F(\zeta) = \zeta \pmod{\mathbb{H}_D(\mu_i)\bar{I}}$ et $F(t_w) = t_w \pmod{\mathbb{H}_D(\mu_i)\bar{I}}$ pour $\zeta \in V$, $w \in W_A(\mu_i)$ est un isomorphisme d'algèbres. On a en particulier :

$$\overline{\mathbb{H}_D(\mu_i)} \simeq \overline{\mathbb{H}_B(\mu_i)} \simeq \mathbb{H}_{gr}(\mu_i).$$

Démonstration. (1) On a vu que $W_A(\mu) \neq W_A(\bar{\mu})$ équivaut à $W_A(\mu_i) \neq W_A(\bar{\mu}_i)$. Soit $w \in W_A(\bar{\mu}_i) \setminus W_A(\mu_i)$, c'est à dire ${}^w\mu_i = -\mu_i$. De ${}^w\mu_i(t_j) = \mu_i(t_{w^{-1}*j}) = -\mu(t_j)$ pour tout j on tire que $\sum_j \mu_i(t_j) = \sum_j \mu_i(t_{w^{-1}*j}) = -\sum_j \mu_i(t_j)$ et donc $\sum_j \mu_i(t_j) = 0$. Cette condition signifie clairement que $n = 2m$ et $i = m$. Inversement si cette condition est vérifiée l'élément w_0 , qui envoie t_j sur t_{n+1-j} , vérifie ${}^w\mu_m = -\mu_m$ et par conséquent $w_0 \in W_A(\bar{\mu}_m) \setminus W_A(\mu_m)$. L'égalité $W_A(\bar{\mu}_m) = W_A(\mu_m) \rtimes \langle w_0 \rangle$ est alors triviale.

(2) On procède comme au § 3.3. On observe que le groupe $W_A(\mu_i)$ est engendré par les réflexions simples s_{α_p} , $\alpha_p \in S_i$, et que par (PBW4) il en résulte $\mathbb{H}_D(\mu_i) = S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W_A(\mu_i) \otimes \mathbb{C}U$. Puisque $\mathbb{C}U/\bar{I}$ est de dimension 1 on a un isomorphisme de $S(V_{\mathbb{C}})$ -modules $\overline{\mathbb{H}_D(\mu_i)} \simeq S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}W_A(\mu_i)$. D'autre part, les relations de définition de $\mathbb{H}_D$ appliquées aux $\alpha_j \in S_i$ étant les mêmes que celles définissant $\mathbb{H}_{gr}(\mu_i)$, l'application F est bien définie et est un isomorphisme. Le dernier isomorphisme a été vu au § 3.3. $\square$

Notons $\bar{\mathcal{A}} = \{\gamma \otimes \bar{\nu} : \gamma \in V_{\mathbb{C}}^*, \bar{\nu} \in U^\vee\}$ l'ensemble des morphismes d'algèbres de $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}U$ vers $\mathbb{C}$. Un élément $w \in W_A$ opère sur $\bar{\mathcal{A}}$ par ${}^w(\gamma \otimes \bar{\nu}) = {}^w\gamma \otimes {}^w\bar{\nu}$. Pour un $\mathbb{H}_D$ -module de dimension finie M on définit de même qu'au § 2.1 les sous-espaces poids et sous-espaces poids généralisés associés à un élément de $\bar{\mathcal{A}}$. Comme $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}U$ est une sous-algèbre commutative de $\mathbb{H}_D$, M est somme directe de ses sous-espaces poids généralisés.

Fixons $\bar{\gamma} = \gamma \otimes \bar{\mu} \in \bar{\mathcal{A}}$ et définissons maintenant le $\mathbb{H}_D$ -module de la série principale $N(\bar{\gamma})$ associé. Si $\mathbb{C}v_{\bar{\gamma}}$ est le $S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}U$ -module de dimension 1 défini par $\bar{\gamma}$, on induit ce module à $\mathbb{H}_D$:

$$N(\bar{\gamma}) = \mathbb{H}_D \otimes_{S(V_{\mathbb{C}}) \otimes \mathbb{C}U} \mathbb{C}v_{\bar{\gamma}}.$$

Ce module admet pour base $\{t_w \otimes v_{\bar{\gamma}} : w \in W_A\}$, ordonnée comme précédemment. Dans cette base les éléments de $V_{\mathbb{C}} \oplus \mathbb{C}U$ admettent une matrice triangulaire supérieure et les poids de $N(\bar{\gamma})$ sont donc les ${}^w\bar{\gamma}$, $w \in W_A$. On notera encore $\psi : \mathbb{H}_D \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}} N(\bar{\gamma})$ la représentation définie par $N(\bar{\gamma})$.

L'étude des $\mathbb{H}_D$ -modules simples se ramène à l'étude des $\mathbb{H}_D$ -modules de la série principale car on montre de même que pour $\mathbb{H}_B$:

Proposition 4.3. *Soit M un $\mathbb{H}_D$ -module simple et $\bar{\gamma} \in \bar{\mathcal{A}}$ un poids de M . Alors M est quotient de $N(\bar{\gamma})$. En particulier tout $\mathbb{H}_D$ -module simple est de dimension au plus $|W_A|$.*

Posons $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \mu \in \mathcal{A}$. Similairement à ce qui a été fait pour $M(\tilde{\gamma})$ on peut décomposer $N(\bar{\gamma})$ en composantes isotypiques sous l'action de U . Soient $w_1 = \text{id}, \dots, w_r$ des représentants des classes à gauche de W_A modulo $W_A(\bar{\mu})$; posons

$$F_j(\bar{\gamma}) = \bigoplus_{w \in W_A(\bar{\mu})} \mathbb{C}t_{w_j w} \otimes v_{\bar{\gamma}}.$$

On a alors

$$N(\bar{\gamma}) = \bigoplus_{j=1}^r F_j(\bar{\gamma}), \quad F_j(\bar{\gamma}) = t_{w_j} \cdot F_1(\bar{\gamma}),$$

et le groupe U opère sur $F_j(\bar{\gamma})$ par le caractère ${}^{w_j}\bar{\mu}$. Observons aussi que les ${}^{w_j}\bar{\mu}$, $j = 1, \dots, r$, forment une famille libre dans le dual $(\mathbb{C}U)^*$ (de même que les ${}^{w_j}\mu \in (\mathbb{C}T)^*$ de la Remarque 3.1). Puisque les éléments de $S(V_{\mathbb{C}})$ et U commutent on obtient comme pour $E_1(\tilde{\gamma})$ (voir Lemme 3.4) :

Lemme 4.4. *La restriction de ψ à $\mathbb{H}_D(\bar{\mu})$ munit $F_1(\bar{\gamma})$ d'une structure de $\mathbb{H}_D(\bar{\mu})$ -module.*

Comme $\mathbb{H}_D \subset \mathbb{H}_B$, le $\mathbb{H}_B$ -module $M(\tilde{\gamma})$ est muni par restriction d'une structure de $\mathbb{H}_D$ -module.

- Proposition 4.5.** (1) *Le $\mathbb{H}_D$ -module $M(\tilde{\gamma})$ s'identifie à $N(\tilde{\gamma})$ par $t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} \mapsto t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$.*
(2) *Soit $w \in W_A$; les $\mathbb{H}_D$ -modules $N(\tilde{\gamma})$ et ${}^w N(\tilde{\gamma})$ sont isomorphes.*
(3) *Il existe un isomorphisme*

$$\sigma\phi : N(\sigma\tilde{\gamma}) \xrightarrow{\sim} N(\tilde{\gamma})$$

tel que $\sigma\phi(t_g \otimes v_{\sigma\tilde{\gamma}}) = t_{g\sigma} \otimes v_{\tilde{\gamma}}$.

- (4) *Le module $N(\tilde{\gamma})$ s'identifie à $\mathbb{H}_D \otimes_{\mathbb{H}_B(\bar{\mu})} F_1(\tilde{\gamma})$. Les applications $Y \rightarrow \mathbb{H}_D \otimes_{\mathbb{H}_D(\bar{\mu})} Y$ et $X \rightarrow X \cap F_1(\tilde{\gamma})$ sont des bijections réciproques de $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_D(\bar{\mu})}(F_1(\tilde{\gamma}))$ sur $\mathcal{L}_{\mathbb{H}_D}(N(\tilde{\gamma}))$.*
(5) *Le $\mathbb{H}_D$ -module $N(\tilde{\gamma})$ est simple si et seulement si le $\mathbb{H}_D(\bar{\mu}_i)$ -module $F_1(\sigma\tilde{\gamma})$ l'est.*

Démonstration. (1) De $M(\tilde{\gamma}) = \bigoplus_{w \in W_A} t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ on tire que $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ engendre $M(\tilde{\gamma})$ comme $\mathbb{H}_D$ -module. D'autre part T opérant sur $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ via le caractère μ , le groupe U agit sur cet élément via $\bar{\mu}$. Donc $1 \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ est de poids $\tilde{\gamma}$ dans le $\mathbb{H}_D$ -module $M(\tilde{\gamma})$. La propriété universelle de l'induction et le fait que $\dim M(\tilde{\gamma}) = \dim N(\tilde{\gamma})$ assurent alors de l'existence d'un isomorphisme de $N(\tilde{\gamma})$ sur $M(\tilde{\gamma})$ tel que $t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}} \mapsto t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ pour tout $w \in W_A$.

- (2) Il suffit d'appliquer la Proposition 2.3 en utilisant l'isomorphisme décrit en (1).
(3) résulte de (1) et du Corollaire 3.3.
(4) La preuve est la même que celle de la Proposition 3.10 en remplaçant $\mathbb{H}_B$ par $\mathbb{H}_D$, T par U , $W_A(\mu)$ par $W_A(\bar{\mu})$ et en utilisant l'indépendance linéaire des ${}^{w_j}\bar{\mu}$, $j = 1, \dots, r$.
(5) découle de (3) et (4). $\square$

Remarquons que $F_1(\tilde{\gamma}) = \bigoplus_{w \in W_A(\bar{\mu})} t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ est un $\overline{\mathbb{H}_D(\bar{\mu})}$ -module contenant le sous-espace $\bigoplus_{w \in W_A(\mu)} \mathbb{C} t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$. Ce dernier est un $\overline{\mathbb{H}_D(\mu)}$ -module qui s'identifie (cf. Proposition 4.5(1)) au sous-espace $E_1(\tilde{\gamma})$. Comme $\psi(\mathbb{H}_D(\mu)) = \psi(\mathbb{H}_B(\mu)) \subset \text{End}_{\mathbb{C}} E_1(\tilde{\gamma})$ (car ces algèbres sont toutes deux engendrées par $\psi(V)$ et $\psi(W_A(\mu))$) on peut indifféremment considérer $E_1(\tilde{\gamma})$ comme un $\overline{\mathbb{H}_D(\mu)}$ ou $\overline{\mathbb{H}_B(\mu)}$ -module.

4.4. Critère d'irréductibilité de $F_1(\tilde{\gamma})$. Le (5) de la Proposition 4.5 ramène la question de l'irréductibilité du module $N(\tilde{\gamma})$ à celle du $\mathbb{H}_D(\bar{\mu}_i)$ -module $F_1(\sigma\tilde{\gamma})$ avec $\sigma\tilde{\gamma} = \sigma\gamma \otimes \mu_i$. On suppose donc dans ce paragraphe que $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \mu$ et $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \bar{\mu}$ avec $\mu = \mu_i$. Rappelons (Lemme 4.2) qu'on a alors

$$\overline{\mathbb{H}_D(\mu)} \simeq \overline{\mathbb{H}_B(\mu)} \simeq \mathbb{H}_{gr}(\mu),$$

où $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ est l'algèbre de Hecke graduée $\mathbb{H}_{gr}(2k, S_i)$, et que le $\mathbb{H}_B(\mu)$ -module $E_1(\tilde{\gamma})$ s'identifie au $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ -module de la série principale $M(\gamma)$ (cf. Lemme 3.7).

4.4.1. *Le cas $W_A(\mu) = W_A(\bar{\mu})$.* On a ici $\mathbb{H}_D(\bar{\mu}) = \mathbb{H}_D(\bar{\mu})$ et donc $F_1(\tilde{\gamma}) = E_1(\tilde{\gamma})$ comme $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ -module. Par conséquent :

$$(4.1) \quad F_1(\tilde{\gamma}) \text{ simple} \iff E_1(\tilde{\gamma}) \text{ simple} \iff M(\gamma) \text{ simple} \iff \mathcal{P}_i(\gamma) = \emptyset.$$

4.4.2. *Le cas $W_A(\mu) \neq W_A(\bar{\mu})$.* Par le Lemme 4.2 on sait que : $n = 2m$, $\mu = \mu_m$, $W_A(\bar{\mu}) = W_A(\mu) \rtimes \langle w_0 \rangle$ où w_0 est le plus grand élément de W_A . Le système de racines R_m est de type $A_{m-1} \times A_{m-1}$ et a pour groupe de Weyl $W_m = W(R_m) \simeq W_A(\mu) \simeq \mathfrak{S}_m \times \mathfrak{S}_m$. On note ϖ_0 le plus grand élément de W_m ; on a donc

$$\varpi_0(\epsilon_j) = \epsilon_{m+1-j}, \quad \varpi_0(\epsilon_{m+j}) = \epsilon_{2m+1-j}$$

pour $j = 1, \dots, m$. Définissons une involution $\tau \in \text{GL}(V)$ par

$$\tau(\epsilon_j) = \epsilon_{m+j}, \text{ pour tout } j \in \{1, \dots, m\}.$$

Comme $\tau(\alpha_{p,q}) = \alpha_{p+m,q+m}$ pour $1 \leq p < q \leq m$, l'application τ permute les éléments de R_m^+ et induit un automorphisme (extérieur), $w \mapsto \tau(w) = \tau w \tau$, de W_m qui vérifie

$$< \tau(\alpha)^\vee, \tau(\xi) > = < \alpha^\vee, \xi >, \quad \tau(s_\alpha) = \tau s_\alpha \tau = s_{\tau(\alpha)},$$

pour tous $\alpha \in R_m$, $\xi \in V$. Remarquons aussi que l'automorphisme $\omega_0 : w \mapsto w_0 w w_0$ de W_m s'écrit

$$\omega_0 = \text{Int}(\varpi_0) \circ \tau = \tau \circ \text{Int}(\varpi_0).$$

Assertion 4.6. (1) *L'automorphisme ω_0 induit un automorphisme involutif de $\mathbb{H}_{gr}(2k, S_m) = \mathbb{H}_{gr}(\mu)$ encore noté ω_0 et donné par*

$$\omega_0(\xi) = w_0(\xi) + 2k \sum_{\alpha \in R_m^+} < \alpha^\vee, w_0(\xi) > t_{s_\alpha}, \quad \omega_0(t_w) = t_{w_0(w)},$$

pour tous $\xi \in V$ et $w \in W_m$.

(2) *Le module ${}^{\omega_0}M(\gamma)$ est isomorphe à $M(\tau\gamma)$, où $\tau\gamma \in V_{\mathbb{C}}^*$ est défini par $\tau\gamma(\xi) = \gamma(\tau(\xi))$.*

Démonstration. (1) Commençons par étendre $\tau \in \text{GL}(V)$ en un automorphisme involutif de $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ en posant $\tau(t_w) = t_{\tau(w)}$ pour $w \in W_m$. Il suffit pour cela de vérifier les relations de définition de $\mathbb{H}_{gr}(2k, S_m)$ sont respectées, ce qui résulte d'un calcul facile. Observons ensuite que $\text{Int}(\varpi_0) : a \mapsto t_{\varpi_0} a t_{\varpi_0}$ est un automorphisme involutif de $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ qui est donné par

$$\text{Int}(\varpi_0)(\xi) = \varpi_0(\xi) + 2k \sum_{\alpha \in R_m^+} < \alpha^\vee, \varpi_0(\xi) > t_{s_\alpha}, \quad \text{Int}(\varpi_0)(t_w) = t_{\varpi_0 w \varpi_0},$$

pour tous $\xi \in V$ et $w \in W_m$ (voir le Lemme 1.4). Il reste alors à remarquer que

$$\text{Int}(\varpi_0) \circ \tau = \tau \circ \text{Int}(\varpi_0) \in \text{Aut}(\mathbb{H}_{gr}(\mu))$$

est l'automorphisme ω_0 cherché.

(2) La définition de ${}^{\omega_0}M(\gamma)$ et l'égalité $\omega_0 = \tau \circ \text{Int}(\varpi_0)$ montrent que ce module est isomorphe à ${}^{\varpi_0}({}^{\tau}M(\gamma))$. Si l'on prouve que ${}^{\tau}M(\gamma) \simeq M(\tau\gamma)$ la Proposition 2.4 donnera alors l'isomorphisme voulu. Observons que $1 \otimes v_\gamma \in {}^{\tau}M(\gamma)$ vérifie $\xi \cdot 1 \otimes v_\gamma = \tau\gamma(\xi) \cdot 1 \otimes v_\gamma$ pour $\xi \in V_{\mathbb{C}}$ et est donc de poids $\tau\gamma$. Il en découle l'existence d'un morphisme surjectif $M(\tau\gamma) \twoheadrightarrow {}^{\tau}M(\gamma)$, qui est un isomorphisme puisque ces deux modules sont de même dimension. $\square$

Définissons deux sous-algèbres de $\text{End}_{\mathbb{C}} F_1(\bar{\gamma})$ par

$$\mathbf{H}(\bar{\mu}) = \psi(\mathbb{H}_D(\bar{\mu})) \supset \mathbf{H}(\mu) = \psi(\mathbb{H}_D(\mu)).$$

L'isomorphisme $\mathbb{H}_{gr}(\mu) \xrightarrow{\sim} \overline{\mathbb{H}_D(\mu)}$ induit un morphisme surjectif d'algèbres $\psi : \mathbb{H}_{gr}(\mu) \twoheadrightarrow \mathbf{H}(\mu)$ tel que $\xi \mapsto \psi(\xi)$ et $t_w \mapsto \psi(t_w)$ pour $\xi \in V, w \in W_A(\mu)$. Dans $\mathbb{H}_D$ l'automorphisme $\text{Int}(w_0)$ est défini par $\text{Int}(w_0)(t_w) = t_{w_0 w w_0}$ et, pour $\xi \in V$,

$$\text{Int}(w_0)(\xi) = w_0(\xi) + \sum_{\alpha \in R_D^+} < \alpha^\vee, w_0(\xi) > t_{s_\alpha} \tilde{k}_\alpha.$$

Remarquons que $\psi(\tilde{k}_\alpha)|_{F_1(\bar{\gamma})} = 0$ lorsque $\alpha \notin R_m$, car $\bar{\mu}(t_p t_{m+q}) = -1$ pour $1 \leq p, q \leq m$, et $\psi(\tilde{k}_\alpha)|_{F_1(\bar{\gamma})} = 2k \cdot \text{id}_{F_1(\bar{\gamma})}$ si $\alpha \in R_m$. Par conséquent $\text{Int}(w_0)$ donne un automorphisme de $\mathbf{H}(\bar{\mu})$, $\text{Int}(w_0) : a \mapsto \psi(t_{w_0} a \psi(t_{w_0}))$ vérifiant

$$\text{Int}(w_0)(\psi(\xi)) = \psi(w_0(\xi)) + 2k \sum_{\alpha \in R_m^+} < \alpha^\vee, w_0(\xi) > \psi(t_{s_\alpha}).$$

Il découle alors de l'Assertion 4.6(1) que $\psi : \mathbb{H}_{gr}(\mu) \rightarrow \mathbf{H}(\mu)$ est tel que

$$\psi(\omega_0(a)) = \text{Int}(w_0)(\psi(a)) \text{ pour tout } a \in \mathbb{H}_{gr}(\mu).$$

Comme $F_1(\tilde{\gamma})$ est un $\mathbf{H}(\bar{\mu})$ -module, nous pouvons le considérer comme un $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ -module grâce à $\psi : \mathbb{H}_{gr}(\mu) \rightarrow \mathbf{H}(\mu) \subset \mathbf{H}(\bar{\mu})$. Nous allons maintenant étudier ce $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ -module. Via l'identification de $E_1(\tilde{\gamma})$ avec $\bigoplus_{w \in W_A(\mu)} \mathbb{C}t_w \otimes v_{\tilde{\gamma}}$ on a

$$F_1(\tilde{\gamma}) = E_1(\tilde{\gamma}) \bigoplus t_{w_0}.E_1(\tilde{\gamma}).$$

Soit $a \in \mathbb{H}_{gr}(\mu)$ et $x \in E_1(\tilde{\gamma})$; il vient $\psi(a).(t_{w_0}.x) = t_{w_0}.(\text{Int}(w_0)(\psi(a)))$. Ceci montre que $t_{w_0}.E_1(\tilde{\gamma})$ est un $\mathbf{H}(\mu)$ -module isomorphe au module tordu $^{\text{Int}(w_0)}E_1(\tilde{\gamma})$. Compte tenu de ce qui précède, ce dernier module, regardé comme $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ -module, est isomorphe à $^{\omega_0}M(\gamma)$. Par l'Assertion 4.6(2) on a ainsi prouvé :

Assertion 4.7. *Le $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ -module $F_1(\tilde{\gamma})$ est isomorphe à $M(\gamma) \oplus M(\tau\gamma)$.*

Lorsque $M(\gamma)$ est simple la nature du $\mathbb{H}_D(\bar{\mu})$ -module $F_1(\tilde{\gamma})$ résulte de l'assertion qui suit.

Assertion 4.8. *Supposons le $\mathbb{H}_{gr}(2k, S_m)$ -module $M(\gamma)$ irréductible. Alors, le $\mathbb{H}_D(\bar{\mu})$ -module $F_1(\tilde{\gamma})$ n'est pas simple si et seulement si $M(\gamma) \simeq M(\tau\gamma)$.*

Démonstration. Observons tout d'abord que l'hypothèse et l'Assertion 4.7 assurent que $F_1(\tilde{\gamma})$ est un $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ -module semi-simple de longueur 2, isomorphe à $M(\gamma) \oplus M(\tau\gamma)$.

Soit V un sous- $\mathbb{H}_D(\bar{\mu})$ -module de $F_1(\tilde{\gamma})$ non nul et différent de $F_1(\tilde{\gamma})$. En tant que $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ -module on a par conséquent $\text{lg } V = 1$ et l'on est dans l'un des deux cas suivants :

- $F_1(\tilde{\gamma}) = V \bigoplus t_{w_0}.E_1(\tilde{\gamma})$ et donc $V \simeq M(\gamma)$;
- $F_1(\tilde{\gamma}) = V \bigoplus E_1(\tilde{\gamma})$ et donc $V \simeq M(\tau\gamma)$.

Plaçons nous dans le premier cas (le deuxième est similaire). Puisque $t_{w_0}.F_1(\tilde{\gamma}) = F_1(\tilde{\gamma})$ et $t_{w_0}.V = V$ on obtient $F_1(\tilde{\gamma}) = V \bigoplus t_{w_0}.E_1(\tilde{\gamma})$ et donc $V \simeq t_{w_0}.E_1(\tilde{\gamma}) \simeq M(\tau\gamma)$ comme $\mathbb{H}_{gr}(\mu)$ -module. D'où $M(\gamma) \simeq M(\tau\gamma)$.

Réciproquement supposons $M(\gamma) \simeq M(\tau\gamma)$. On a donc $E_1(\tilde{\gamma}) \simeq ^{\text{Int}(w_0)}E_1(\tilde{\gamma})$, simple comme $\mathbf{H}(\mu)$ -module. Fixons un isomorphisme $f : E_1(\tilde{\gamma}) \xrightarrow{\sim} ^{\text{Int}(w_0)}E_1(\tilde{\gamma})$. On peut itérer f dans le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $E_1(\tilde{\gamma})$; il vient, pour $a \in \mathbf{H}(\mu)$ et $x \in E_1(\tilde{\gamma})$:

$$f(a \cdot x) = f(\text{Int}(w_0)(a).x) = \text{Int}(w_0)(a) \cdot f(x) = \text{Int}(w_0)^2(a).f(x) = a.f(x).$$

Donc $f : ^{\text{Int}(w_0)}E_1(\tilde{\gamma}) \rightarrow E_1(\tilde{\gamma})$ est $\mathbf{H}(\mu)$ -linéaire et il en découle que f^2 est un automorphisme de $E_1(\tilde{\gamma})$. Par le lemme de Schur $f^2 = \lambda \cdot \text{id}$ pour un $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Soit $z \in \mathbb{C}^*$ tel que $z^2 = \lambda$; quitte à remplacer f par $\frac{1}{z}f$ on peut ainsi supposer que $f^2 = \text{id}$. Définissons maintenant

$$V = \{x + t_{w_0}.f(x) : x \in E_1(\tilde{\gamma})\}.$$

Soit $x \in E_1(\tilde{\gamma})$. Pour $a \in \mathbf{H}(\mu)$ il vient $a.(x + t_{w_0}.f(x)) = a.x + t_{w_0} \text{Int}(w_0)(a).f(x) = a.x + t_{w_0}f(a.x) \in V$. De plus $t_{w_0}.(x + t_{w_0}.f(x)) = t_{w_0}.x + f(x) = t_{w_0}.f^2(x) + f(x) \in V$. Donc V est un sous- $\mathbb{H}_D(\bar{\mu})$ -module de $F_1(\tilde{\gamma})$. Comme l'application $x + t_{w_0}.f(x) \mapsto x$ de V sur $E_1(\tilde{\gamma})$ est un isomorphisme de $\mathbf{H}(\mu)$ -modules, V est un sous-module propre de $F_1(\tilde{\gamma})$. $\square$

4.5. **Critère d'irréductibilité de $N(\bar{\gamma})$.** On retourne au cas général : $\bar{\gamma} = \gamma \otimes \bar{\mu} \in \bar{\mathcal{A}}$, $\tilde{\gamma} = \gamma \otimes \bar{\mu} \in \mathcal{A}$. On a fixé $\sigma \in W_A$ comme au § 3.1 tel que ${}^\sigma\tilde{\gamma} = {}^\sigma\gamma \otimes {}^\sigma\mu$ avec ${}^\sigma\mu = \mu_i$ pour un $i \in \{1, \dots, n\}$. Rappelons que R_i est le système de racines de type $A_{i-1} \times A_{n-i-1}$ associé, de groupe de Weyl $W_i = W(R_i) \simeq \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{S}_{n-i}$. On sait alors que la condition $\mathcal{P}_i({}^\sigma\gamma) = \{\alpha \in R_i^+ : \gamma(\sigma(\alpha)) = \pm 2k\} = \emptyset$ est nécessaire et suffisante pour que $M(\tilde{\gamma})$ soit irréductible, ou encore que le $\mathbb{H}_{gr}(2k, S_i)$ -module $M({}^\sigma\gamma)$ soit irréductible, cf. Théorème 3.11. Lorsque $n = 2m$ on a noté $\tau \in \text{GL}(V_{\mathbb{C}})$ l'involution telle que $\tau(\epsilon_j) = \epsilon_{m+j}$, $\tau(\epsilon_{m+j}) = \epsilon_j$ pour tout $j \in \{1, \dots, m\}$.

Le théorème suivant donne un critère d'irréductibilité pour $N(\bar{\gamma})$.

Théorème 4.9. *Avec les notations précédentes :*

(a) si $W_A(\mu) = W_A(\bar{\mu})$,

$$N(\bar{\gamma}) \text{ simple} \iff \mathcal{P}_i({}^\sigma\gamma) = \emptyset;$$

(b) si $W_A(\mu) \neq W_A(\bar{\mu})$, alors $n = 2m$, $i = m$, et

$$N(\bar{\gamma}) \text{ simple} \iff \{\mathcal{P}_m({}^\sigma\gamma) = \emptyset \text{ et } \tau\gamma \notin W_m \cdot {}^\sigma\gamma\}.$$

Démonstration. Comme nous l'avons vu au § 4.4, l'irréductibilité de $N(\bar{\gamma})$ est équivalente à celle du $\mathbb{H}_D(\bar{\mu}_i)$ -module $F_1({}^\sigma\tilde{\gamma})$.

(a) résulte trivialement de (4.1).

(b) Supposons $N(\bar{\gamma})$ simple. Le fait que $M(\tilde{\gamma}) = N(\bar{\gamma})$ comme $\mathbb{H}_D$ -module force la simplicité de $M(\tilde{\gamma})$ comme $\mathbb{H}_B$ -module, i.e. $M({}^\sigma\gamma)$ est un $\mathbb{H}_{gr}(2k, S_m)$ -module simple. Par l'Assertion 4.8 on obtient que $M({}^\sigma\gamma)$ n'est pas isomorphe à $M(\tau\gamma)$; la Remarque 2.5 assure alors que $\tau\gamma \notin W_m \cdot {}^\sigma\gamma$.

La réciproque est similaire : si $M({}^\sigma\gamma)$ est simple et $\tau\gamma \notin W_m \cdot {}^\sigma\gamma$, la Remarque 2.5 et l'Assertion 4.8 montrent que $F_1({}^\sigma\tilde{\gamma})$ est irréductible. $\square$

RÉFÉRENCES

- [1] Y. Berest, P. Etingof and V. Ginzburg, *Finite dimensional representations of rational Cherednik algebras*, Int. Math. Res. Notices, **19** (2003), 1053-1088.
- [2] C. Dezélée, *Représentations de dimension finie de l'algèbre de Cherednik rationnelle*, Bull. S.M.F., à paraître (2003).
- [3] P. Etingof and V. Ginzburg, *Symplectic reflection algebras, Calogero-Moser space, and deformed Harish-Chandra homomorphism*, Invent. Math., **147** (2002), 243-348.
- [4] S. Kakei, *Intertwining operators for a degenerate double affine Hecke algebra and multivariable orthogonal polynomials*, J. Math. Phys., vol. 39 (1998), 4993-5006.
- [5] C. Kriloff and A. Ram, *Representations of graded Hecke algebra*, Representation Theory, **6** (2002), 31-69.
- [6] G. Lusztig, *Affine Hecke algebras and their graded versions*, J. Amer. Soc., **2** (1989), 599-635.
- [7] E. Opdam, *Harmonic analysis for certain representations of graded Hecke algebras*, Acta Math., **175** (1995), 75-121.

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES, UNIVERSITÉ DE BREST, 29285 BREST CEDEX, FRANCE
E-mail address: `Charlotte.Dezelee@univ-brest.fr`